

MITOMYCINE ACCORD 10 mg, poudre pour solution injectable/ pour perfusion ou voie intravésicale

Rupture de stock 1 avr. 2021

DCI

Mitomycine C

Indications

La mitomycine est utilisée dans le traitement palliatif des tumeurs.

La mitomycine est administrée par voie intraveineuse dans le cadre d'une monochimiothérapie ou d'une polychimiothérapie cytostatique dans les cas suivants :

- carcinome gastrique métastatique avancé
- carcinome du sein avancé et/ou métastatique

Par ailleurs, la mitomycine est administrée par voie intraveineuse dans le cadre d'une polychimiothérapie, dans les cas suivants :

- carcinome bronchique non à petites cellules
- carcinome pancréatique avancé

Administration intravésicale pour la prévention des récurrences dans le cancer superficiel de la vessie après une résection transurétrale.

Observations particulières

- Rupture de stock depuis le 24 mars 2021
- Remise à disposition prévue courant juin 2021

Lire aussi

- Mitomycine C : point sur les alternatives et les indications jugées prioritaires et sur le risque d'erreur médicamenteuse
- AMETYCINE 10 mg poudre pour solution injectable et AMETYCINE 40 mg , poudre pour solution pour irrigation vésicale

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les pharmaciens de détail est suspendue à compter du 27 janvier 2021 et des dispositions des articles L. 512-39 et L. 5124-17 du Code de la Santé Publique. Cette mesure d'introduction de l'ordonnance en dehors du territoire national, ou l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition de l'ordonnance de médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié au marché national.

