

PUBLIÉ LE 24/09/2021

BRIDION 100 mg/ml, solution injectable - Boîte de 10 flacons de 5 mL

Tension d'approvisionnement 7 sept. 2021

DCI

sugammadex

Indications

- Décurarisation chez l'adulte après bloc neuromusculaire induit par le rocuronium ou le vécuronium.
- Population pédiatrique: le sugammadex est recommandé uniquement pour la décurarisation en routine après un bloc neuromusculaire induit par le rocuronium chez l'enfant et l'adolescent âgés de 2 à 17ans.

Laboratoire exploitant

MSD FRANCE

Observations particulières

- Distribution contingentée sur le marché des établissements de santé pour la présentation de 10 flacons de 5 mL uniquement
- ↓ Lettre d'information du laboratoire MSD FRANCE en date du 07 septembre 2021 à l'attention des pharmaciens hospitaliers
- Remise à disposition normale prévue en octobre 2021

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles de vente et l'exportation du médicament par les pharmaciens hospitaliers, le 27 septembre 2021, les dispositions des articles L5123-13 et L5123-14 du Code de la Santé Publique ont été publiées au Journal Officiel de la République Française. Ces dispositions ont pour objet de permettre l'approvisionnement en continu et approprié du territoire national et respectée