

PUBLIÉ LE 27/10/2021 - MIS À JOUR LE 09/08/2022

Actosolv 100 000 UI et 600 000 UI, poudre pour solution injectable / pour perfusion | - [Urokinase]

Rupture de stock 30/11/2021

DCI

Urokinase (Mammifère / Humain / Urine)

Indications

- Traitement des occlusions artérielles et veineuses provoquées par un thrombus en formation ou récemment formé et des embolies pulmonaires, en particulier lorsqu'un traitement thrombolytique récent par la streptokinase contre-indique son emploi.
- Restauration de la perméabilité des cathéters veineux (cathéters veineux centraux et cathéters de dialyse), en cas d'obstruction liée à un thrombus en formation ou récemment formé.

Laboratoire exploitant

Eumedica

Observations particulières

- Rupture de stock due à un défaut qualité.
- Alternative thérapeutique: Therasolv 100 000, 250 000 ou 500 000 UI, spécialité à base d'urokinase disposant d'une AMM.

Attention: Therasolv et Actosolv sont deux spécialités distinctes et possèdent des recommandations d'utilisation différentes: consulter le RCP de Therasolv avant utilisation.

Consultez la conduite à tenir dans un contexte de tensions d'approvisionnement de thrombolytiques

gtinggriesztriagiertrigteuscherstigebaritertropertrappgatrappgatrappgatrien der besteinten der besteintertrope Geste ansvernetrigtertroppgride kontrappropensiertreit der netten in und provision behan der sporten der sport