

## Rapamune 1 mg/ml, solution buvable| - [Sirolimus]

Remise à disposition 26 août 2022

### DCI

Sirolimus

### Indications

Rapamune est indiqué chez les patients adultes présentant un risque immunologique faible à modéré recevant une transplantation rénale, en prévention du rejet d'organe. Il est recommandé d'initier le traitement par Rapamune en association avec la ciclosporine microémulsion et les corticoïdes pendant 2 à 3 mois. Rapamune peut être poursuivi en traitement d'entretien avec des corticoïdes seulement si la ciclosporine microémulsion peut être arrêtée progressivement.

Rapamune est indiqué en traitement de la lymphangioliéiomyomatose sporadique avec atteinte pulmonaire modérée ou détérioration de la fonction pulmonaire.

### Laboratoire exploitant

Pfizer

### Observations particulières

- Remise à disposition normale

*Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les pharmaciens est autorisée jusqu'au 31 décembre 2022. Les dispositions des articles L5123-1 et L5124-1 du code de la santé publique, prises en application de l'article 17 de la loi n° 2016-161 du 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L5123-1 et L5124-1 du code de la santé publique, sont suspendues jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié au marché national et respecté.*