

Hexatrione 2 pour cent, suspension injectable (intra-articulaire) - [hexacetonide de triamcinolone]

Tension d'approvisionnement 24/02/2023

DCI

Hexacétonide de triamcinolone

Indications

Ce sont celles de la corticothérapie locale, lorsque l'affection justifie une forte concentration locale. Toute prescription d'injection locale doit faire la part du danger infectieux notamment du risque de favoriser une prolifération bactérienne.

Ce produit est indiqué dans les affections rhumatologiques en injections intra-articulaires: arthrites inflammatoires (formes adultes, arthrite juvénile idiopathique chez le nourrisson âgé d'au moins un an, chez l'enfant et l'adolescent), arthrose en poussée.

Laboratoire exploitant

Ethypharm

Observations particulières

- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville

↓ Lettre d'information du laboratoire Ethypharm en date du 28/05/2025 à l'attention des professionnels de santé (28/05/2025)

- Dans l'indication arthrite juvénile idiopathique chez le nourrisson âgé d'au moins 1 an un stock de dépannage est réservé afin d'honorer les prescriptions dans cette indication spécifiquement.
- Date de remise à disposition prévue : premier semestre 2026

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles de vente et l'exportation du médicament par les puissances publiques 2018/41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2018 et des dispositions des articles L.5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique, jusqu'à la remise à disposition mentionnée au point précédent, une approvisionnement continu et approfondi du marché national.