

# Revaxis, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) à teneur réduite en antigènes - [anatoxine diphtérique, anatoxine tétanique, virus poliomyélitique inactivé]

Arrêt de commercialisation 19/08/2024

## DCI

Vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique (inactivé), adsorbé, à teneur réduite en antigènes  
Anatoxine diphtérique ((*bactérie/corynebacterium diphtheriae*))  
Anatoxine tétanique ((*bactérie/clostridium tetani*))  
Virus poliomyélitique souche Mahoney de type 1 inactivé ((*mammifère/singe/cellules vero*))  
Virus poliomyélitique souche MEF-1 de type 2 inactivé ((*mammifère/singe/cellules vero*))  
Virus poliomyélitique souche Saukett de type 3 inactivé ((*mammifère/singe/cellules vero*))

## Indications

Chez l'adulte, en rappel d'une vaccination antérieure, pour la prévention conjointe de la diphtérie, du téstanos et de la poliomyélite.

Il convient de se référer aux recommandations officielles du calendrier vaccinal.

A titre exceptionnel, pour les rappels de l'enfant et de l'adolescent à l'âge de 6 ans et de 11-13 ans, ce vaccin peut être utilisé en cas de contre-indication à la vaccination coquelucheuse.

## Laboratoire exploitant

Sanofi Pasteur Europe

## Observations particulières

- Arrêt de commercialisation

Pour connaître les alternatives possibles à ce vaccin, consulter [vaccination-info-service.fr](http://vaccination-info-service.fr) ou bien se référer aux recommandations de la HAS ou au guide de l'OMS sur l'utilisation au niveau national des dispositifs de vaccination susmentionnés dans le cadre de la politique de santé publique, jusqu'à la mise à disposition totale du marché, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.