

Kanokad 25 UI/mL de facteur IX, poudre et solvant pour solution injectable - Flacon de 250 UI (10 ml) et de 500 UI (20 ml)

Rupture de stock 27/11/2023

DCI

facteur II de coagulation humain ((mammifère/humain/plasma))
facteur IX de coagulation humain ((mammifère/humain/plasma))
facteur VII de coagulation humain ((mammifère/humain/plasma))
facteur X de coagulation humain ((mammifère/humain/plasma))
protéine C humaine ((mammifère/humain/plasma))
protéine S ((mammifère/humain/plasma))

Indications

- Traitement des saignements et prophylaxie péri-opératoire des accidents hémorragiques lors d'un déficit acquis en facteurs de coagulation du complexe prothrombique comme le déficit induit par un traitement par anti-vitamines K, ou en cas de surdosage en anti-vitamines K, quand une correction urgente du déficit est requise.
- Traitement des saignements et prophylaxie péri-opératoire d'accidents hémorragiques lors d'un déficit congénital de l'un des facteurs vitamine K dépendants, lorsqu'aucun facteur de coagulation spécifique de haute pureté n'est disponible.

Laboratoire exploitant

LFB Biomédicaments

Observations particulières

- Situation à l'hôpital : rupture
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Cofact 500 UI powder and solvent for solution for injection initialement destinées au marché belge du laboratoire Prothya

↓ Lettre d'information du laboratoire Prothya à l'attention des professionnels de santé

- Report sur les alternatives disponibles

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes et les pharmaciens sont interdites. La vente et l'exportation de cette thérapie sont autorisées si le dépositaire de la sécurité nationale jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national, est respectée.

