

VARIVAX|, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin varicelleux (vivant)

Remise à disposition 9 août 2021

DCI

Virus de la varicelle souche Oka

Indications

- Indiqué chez les sujets à partir de 12 mois pour la prévention de la varicelle.
- Peut être administré aux nourrissons à partir de l'âge de 9 mois dans certaines circonstances telles que conformément au calendrier vaccinal national ou lors de situations épidémiques.
- Peut aussi être administré aux sujets "réceptifs" exposés à la varicelle. Une vaccination dans les 3 jours suivant l'exposition peut prévenir une infection clinique ou modifier son développement. De plus, il existe des données limitées indiquant que la vaccination jusqu'à 5 jours après l'exposition pourrait modifier le développement de l'infection.

Laboratoire exploitant

MSD VACCINS S.A.S.

Observations particulières

- Remise à disposition.

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les distributeurs de produits de santé est interdite en France et dans les pays tiers à compter du 27 janvier 2021. Cette mesure est prise en vertu de l'article L. 5124-30 et L. 5124-173 du Code de la Santé Publique. Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, qui s'applique également à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition nationale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.