



Complications pouvant être associées à la pose d'implants de renfort pariétal

PUBLIÉ LE 29/05/2026

Comme tout dispositif médical implantable, la pose d'un implant de renfort pariétal peut entraîner des complications.

Certaines réactions sont courantes après une opération :

- Douleurs après l'intervention ;
- Hématomes : ils apparaissent le plus souvent dans les jours qui suivent l'opération ;
- Inflammation locale : rougeur, gonflement, douleur ou sensation de chaleur au niveau de la zone opérée ;
- Sérome : gonflement lié à une accumulation de liquide dans la zone opérée. Il apparaît généralement quelques jours après l'intervention et disparaît le plus souvent spontanément.

Si ces symptômes durent dans le temps ou s'intensifient, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.

D'autres complications sont également susceptibles de se produire. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants ou présentez d'autres complications après la pose d'un implant de traitement des hernies, consultez rapidement un médecin et prenez contact avec votre chirurgien :

- Douleurs qui persistent dans le temps (plusieurs mois) ;
- Inflammation prolongée ou tardive : rougeur, gonflement, douleur ou chaleur locale qui apparaît à distance de l'intervention ou qui dure plusieurs semaines après ;
- Sérome persistant : accumulation de liquide qui ne disparaît pas spontanément ;
- Infection : présence de bactéries au niveau de la zone opérée, pouvant entraîner douleur, fièvre ou écoulement au niveau de la cicatrice ;
- Réapparition d'une hernie au même endroit (récidive).

La liste de tous les effets indésirables potentiels de votre implant est disponible sur la notice d'utilisation fourni avec le dispositif. Retrouvez la notice sur le site internet de certains fabricants.

Cette liste d'effets indésirables potentiels sera prochainement disponible dans la base européenne Eudamed (en cours de construction) via le résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques des dispositifs.

La référence du dispositif est essentielle pour vous permettre de vous renseigner sur votre implant. Elle figure sur la carte d'implant qui vous est remise après l'opération par l'équipe chirurgicale. Vous pouvez aussi demander cette information directement à votre chirurgien.

Pour en savoir plus

[Eudamed](#)

[Pose d'un implant de renfort de paroi - Brochure à destination des patients - Omedit](#)