

Traitement des hernies par implant de renfort pariétal

PUBLIÉ LE 29/05/2026

Qu’est-ce qu’une hernie de la paroi abdominale ?

La hernie se manifeste par une grosseur ou une boule visible sous la peau. Elle apparaît lorsqu’une partie d’un organe (notamment l’intestin) ou du péritoine (membrane qui entoure les organes de l’abdomen) **passe à travers une zone affaiblie de la paroi musculaire, qui maintient normalement les organes en place, ou la paroi abdominale.**

Ces hernies peuvent se former à différents endroits de l’abdomen.

Elles s’observent le plus souvent au niveau de l’aine, on parle alors de hernies inguinales, autour du nombril dans le cas des hernies ombilicales, au-dessus du nombril pour les hernies de la ligne blanche ou encore de hernies incisionnelles (ou éventrations), qui apparaissent au niveau d’une ancienne cicatrice chirurgicale lorsque la paroi abdominale reste fragilisée après une opération.

Traitement des hernies

Lorsqu’il est nécessaire de remettre en place les tissus ou organes et de renforcer la zone défaillante de la paroi abdominale, le traitement repose le plus souvent sur une intervention chirurgicale.

Il existe plusieurs façons d’opérer les hernies abdominales, et le choix du chirurgien va dépendre de**plusieurs paramètres** : type et taille de la hernie, symptômes, état de santé global du patient, antécédents, s’il s’agit d’une urgence ou non...

Dans ce dossier, nous nous concentrons spécifiquement sur les implants de traitement des hernies (ou implants de renfort pariétal) et leur surveillance.

A DÉCOUVRIR DANS CE DOSSIER



Qu’est-ce qu’un implant de renfort pariétal ?



Complications pouvant être associées à la pose d’implants de renfort pariétal



Quelles sont les actions de l’ANSM pour surveiller ces dispositifs ?