



PUBLIÉ LE 27/04/2022 - MIS À JOUR LE 02/05/2022

Vaccination et grossesse

La vaccination est essentielle pour la protection de la mère et celle de son futur enfant contre des maladies potentiellement graves comme la coqueluche, la grippe, ou encore la Covid-19.

La vaccination concerne directement la future mère, qu'elle ait un projet de grossesse ou qu'elle soit déjà enceinte, mais également son entourage, afin qu'elle-même et son enfant puissent bénéficier d'une meilleure protection collective.

Une maman vaccinée va également transmettre à son enfant les défenses nécessaires grâce aux anticorps, lui permettant ainsi de lutter contre ces maladies dès sa naissance et dans l'attente de sa propre vaccination.

A retenir

- Contracter certaines maladies pendant la grossesse peut avoir des conséquences graves pour la future maman et son bébé (risque d'infection chez la future mère pouvant conduire à des complications pulmonaires ou cardiaques, de malformation chez l'enfant, de fausse-couche, de naissance prématurée...).
- **Anticiper sa grossesse** permet de mettre à jour si besoin son statut vaccinal et surtout de réaliser les vaccinations qui ne pourront pas être faites pendant la grossesse. **Les vaccins recommandés avant la grossesse sont ceux de la rubéole, de la rougeole et de la varicelle si ces maladies n'ont pas été contractées avant.**
- Les **vaccins recommandés pendant la grossesse sont les vaccins contre la grippe saisonnière et les deux vaccins à ARNm contre la Covid-19**, dès le premier trimestre de la grossesse et quel que soit son stade, et **contre la coqueluche** à partir du 2nd trimestre. Les données disponibles (chez l'animal et celles observées chez l'Homme) n'ont pas montré de conséquence ni sur le déroulement de la grossesse, ni sur le développement de l'embryon ou du fœtus.
- **Les vaccins vivants ou vivants atténués** ne doivent **en aucun cas être utilisés** pendant la grossesse en raison d'un risque potentiel d'infection du fœtus. C'est le cas des vaccins contre la rougeole, oreillons, rubéole (ROR), et la varicelle. Par précaution, toute grossesse doit être évitée dans le mois qui suit ce type de vaccination.
- D'autres vaccins peuvent être administrés dans un contexte particulier, notamment en cas de voyage impératif ou de risque important de contracter la maladie, et uniquement après examen approfondi, par la femme et son professionnel de santé des risques et bénéfices potentiels pour la mère et le futur enfant.
- D'une façon générale, une vaccination réalisée par inadvertance au cours de la grossesse, ne doit pas être un motif d'interruption de grossesse, quel que soit le type de vaccin, y compris les vaccins vivants atténués. Informer le médecin ou la sage-femme qui suit la grossesse pour, si besoin, adapter le suivi.

Dès le projet de grossesse

Faire part de son projet de grossesse au plus tôt est l'occasion pour le médecin ou la sage-femme de s'assurer de la mise à jour des vaccinations de la future mère.

Ceci est d'autant plus important que certains vaccins essentiels lors d'une grossesse ne pourront pas être réalisés pendant cette dernière. Il s'agit notamment des vaccins vivants atténués, tels que les vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) ou encore celle contre la varicelle.

Anticiper sa grossesse permet de mettre à jour ses vaccins et protéger ainsi son enfant.

La vaccination contre **la rubéole** doit être réalisée si la femme ne l'a pas déjà contractée ou si elle n'a pas déjà été vaccinée. Une analyse de sang sera réalisée pour vérifier la présence d'anticorps. La rubéole peut être à l'origine de graves malformations (cérébrales, oculaires ou encore auditives) chez l'enfant lorsque la femme la contracte au début de sa grossesse.

Si la femme n'a pas contracté **la varicelle**, son médecin lui conseillera également de se faire vacciner avant la grossesse. En effet, la varicelle chez une femme enceinte, notamment au cours des 4 premiers mois, peut être à l'origine de malformations chez l'enfant ; contractée en fin grossesse, elle peut provoquer chez le nouveau-né une forme grave de la varicelle à sa naissance.

La vaccination contre **la rougeole** est aussi importante. En effet, contractée pendant la grossesse, elle peut entraîner des fausses couches.

Selon la situation personnelle de la mère, notamment de son lieu de résidence ou de son projet de voyager lorsqu'elle sera enceinte, son médecin ou sa sage-femme pourra également lui recommander la réalisation d'autres vaccins, comme le vaccin contre la fièvre jaune.

Pendant la grossesse

Les vaccinations **contre la grippe saisonnière et contre la Covid-19** sont recommandées chez la femme enceinte. En effet, ces deux maladies peuvent être à l'origine de complications importantes chez la femme enceinte, comme une fièvre extrême, des difficultés respiratoires, et peuvent mettre en danger son futur bébé (fausse couche, naissance prématurée).

La vaccination contre **la coqueluche** est recommandée à partir du deuxième trimestre de grossesse (en privilégiant la période entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée). La coqueluche est une maladie grave chez le nourrisson, notamment du fait des difficultés respiratoires qu'elle peut entraîner chez les tout-petits. La vaccination de la mère permettra de transmettre à l'enfant, via le placenta, les anticorps et de le protéger dans ses premiers mois de vie. Cette vaccination sera réalisée à chaque grossesse quel que soit le statut vaccinal de la mère.

Après la grossesse

Si la mise à jour des vaccins n'a pas pu se faire avant ou pendant la grossesse, elle pourra s'effectuer après l'accouchement, en tenant compte de l'allaitement maternel.

Pour la coqueluche, le médecin ou la sage-femme pourra également proposer de vacciner contre la coqueluche l'entourage du nourrisson tel que la mère si cela n'a pu être fait pendant la grossesse et le second parent, les frères et sœurs, les grands-parents, baby-sitter.... Cette vaccination permet de protéger le futur enfant de cette maladie dans une stratégie appelée la stratégie de cocooning.

Pour connaître les différents vaccins par maladie et leur possibilité ou non de les utiliser pendant la grossesse, consultez le document ci-dessous

[Vaccins et grossesse : Information sur les vaccins disponibles et la conduite à tenir](#)



Indications du vaccin	Nom de la spécialité	Type de vaccin	Conduite à tenir chez la femme enceinte ou susceptible de l'être
Choléra	Dukoral	Vaccin recombinant inactivé contenant 4 souches de Vibrio cholerae sérotype O1 et la sous-unité B de la toxine cholérique recombinante (CTB)	Peut être administré pendant la grossesse.
Covid-19	Comirnaty Pfizer/BioNTech Spikevax Moderna	Vaccin à ARNm	Peut être utilisé à tous les stades de la grossesse.
	Vaccinze AstraZeneca	Vaccin à adénovirus (non répliquatif)	
	Covid-19 Vaccine Janssen Novavaxovid Novavax	Vaccin à adénovirus (non répliquatif) Vaccin recombinant avec adjuvant (saponine)	N'est pas recommandé pendant la grossesse.
Diphtérie, Tétanos, Poliovirus (DTaP) Coqueluche (CtAP)	Repevax Bocodivertina	Vaccin intraveineux à teneur réduite en antigènes (DTaP) Vaccin intramusculaire, tétravalent, coquelucheux (accéléré multicomposé) et poliovirémique [inactivé], adsorbé sur phosphate/hydroxyde d'aluminium	Vaccin contre la coqueluche : peut être utilisé au cours du 2 ^e et 3 ^e trimestre de grossesse selon les recommandations officielles.
Diphtérie, Tétanos, Poliovirus (dTP)	Revarix	Vaccin trivalent [inactivé] à teneur réduite en antigènes, adsorbé sur hydroxyde d'aluminium	N'est pas recommandé pendant la grossesse.
Encéphalite à Igues	Encapur Ticovac	Vaccin monovalent [inactivé, adsorbé sur hydroxyde d'aluminium]	Ne doit pas être utilisé pendant la grossesse sauf en cas de réel besoin et seulement après examen approfondi des risques et bénéfices potentiels.
Encéphalite japonaise	Intero	Vaccin monovalent [inactivé, adsorbé sur hydroxyde d'aluminium]	Éviter d'utiliser pendant la grossesse.
Filvra Jane	Stamart	Vaccin vivant atténué monovalent	Ne doit pas être utilisé pendant la grossesse sauf en cas de réel besoin et seulement après examen approfondi des risques et bénéfices potentiels.

Indications du vaccin	Nom de la spécialité	Type de vaccin	Conduite à tenir chez la femme enceinte ou susceptible de l'être
Crippe salmonella	Influvac Tetra	Vaccin intraveineux [inactivé, à antigène de surface]	Peut être utilisé à tous les stades de la grossesse.
	Vaxigrip Tetra	Vaccin intraveineux [inactivé, avian/fragement]	
Hépatite A et Filèvre typhoïde	Tygevax	Vaccin bivalent de l'hépatite A [inactivé, adsorbé sur hydroxyde d'aluminium] et typhoïdique [polysaccharidique]	N'est pas recommandé. Si nécessaire, privilégier les formes monovalentes.
Hépatite A	Avaxim 160 U Havrix 1440 LU/1 mL Havrix 50 U/1 mL	Vaccin monovalent [inactivé, adsorbé sur hydroxyde/hydrogénéphosphate d'aluminium]	Éviter d'utiliser ce vaccin pendant la grossesse sauf en situation de risque de contamination important.
Hépatite B et hépatite A	Twintrix Adulte	Vaccin bivalent de l'hépatite A [inactivé] et de l'hépatite B [ADN] [HBe] [adsorbé sur phosphate d'aluminium]	Ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Reporter la vaccination après l'accouchement à moins d'une nécessité absolue de protéger la mère d'une infection contre l'hépatite B.
Hépatite B	Engerix B 20 Hépanrix B 10	Vaccin monovalent [ADN recombinant adsorbé sur hydroxyde/hydrogénéphosphate d'aluminium]	Ne doit pas être utilisé pendant la grossesse sauf si est jugé clairement nécessaire.
Infections à papillomavirus humains (HPV)	Cervarix	Vaccin bivalent (HPV types 16, 18) [recombinant avec adjuvant AS04, adsorbé sur hydroxyde d'aluminium]	N'est pas recommandé pendant la grossesse. Reporter la vaccination après l'accouchement.
	Gardecil 9	Vaccin nonavalent dont HPV types 16 et 18, 31, 33, 35, 39, 45 [ADN, adsorbé sur sulfate d'hydrogénéphosphate d'aluminium]	
Infections à pneumocoques (IP)	Prevenar 13	Vaccin 13-valent polysaccharidique conjugué (adsorbé sur phosphate d'aluminium)	Éviter d'utiliser ce vaccin pendant la grossesse.
	Pneumovax	Vaccin 23-valent, polysaccharidique	



Indications du vaccin	Nom de la spécialité	Type de vaccin	Conduite à tenir chez la femme enceinte ou susceptible de l'être	
Infections bactériennes à méningocoques (IM)	Vaccins méningocoques du groupe B	Bexsero Tumenbe	Vaccin monovalent, protéique [ADN, composé, adsorbé sur hydroxyde/phosphate d'aluminium]	Éviter d'utiliser ce vaccin pendant la grossesse sauf en situation de risque manifeste d'exposition à une infection méningocoque.
	Vaccin méningocoque du groupe C	Menjugate 10	Vaccin monovalent, polysaccharidique conjugué à la protéine CRM ₁₉₇ , adsorbé sur hydroxyde d'aluminium	
	Vaccin méningocoque polysaccharidique du groupe C	Nimovax	Vaccin monovalent conjugué à l'antigène tétravalent (adsorbé sur hydroxyde d'aluminium)	
	Vaccins méningocoques des groupes A, C, W-135 et Y	Menoveo Nimensor	Vaccin tétravalent conjugué à la protéine CRM ₁₉₇ (Menveo) ou tétravalent (Nimensor)	
Poliovirus	Inovax Polio	Vaccin monovalent [inactivé]	Éviter d'utiliser ce vaccin pendant la grossesse sauf en situation de risque important.	
Rage	Vaccin rabique Pasteur Rabipur	Vaccin monovalent [inactivé]	Peut être utilisé pendant la grossesse lorsque une prophylaxie est nécessaire. En raison de la gravité de la maladie, la conduite de la vaccination ne doit pas être modifiée par la grossesse.	
Rougeole, Oreillons, Rubéole (OR)	Prionis M-M-Rvaxpro	Vaccin vivant atténué tétavalent	Contre-indiqué pendant la grossesse. Toute grossesse doit être évitée dans le mois suivant la vaccination.	
Tuberculose	BCC A/Vaccines	Vaccin vivant atténué	Ne doit pas être utilisé pendant la grossesse sauf dans les zones à haut risque d'infection tuberculeuse, si le bénéfice de la vaccination l'emporte sur les risques potentiels.	
Filvra typhoïde	Typhim VI	Vaccin monovalent, polysaccharidique	Éviter d'utiliser pendant la grossesse sauf en cas de fort risque d'exposition à la fièvre typhoïde, compte-tenu de la gravité de la maladie.	
Varicelle	Varivax Varivax	Vaccin vivant atténué monovalent	Contre-indiqué pendant la grossesse. Toute grossesse doit être évitée dans le mois suivant la vaccination.	
Zona	Zostavax	Vaccin vivant atténué monovalent	Contre-indiqué pendant la grossesse. Toute grossesse doit être évitée dans le mois suivant la vaccination.	



Vaccins et grossesse : téléchargez l'information sur les vaccins disponibles et la conduite à tenir



Pour en savoir plus

[Recommandation vaccinale contre la coqueluche chez la femme enceinte - HAS](#)

[Pour plus d'information sur la vaccination et la grossesse, rendez-vous sur \[vaccination.info-service.fr\]\(http://vaccination.info-service.fr\)](#)