RISQUES MEDICAMENTEUX - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 04/07/2018 - MIS À JOUR LE 23/04/2021

Céritinib (ZYKADIA ® 150 mg-gélule) - Nouvelle posologie recommandée d’initiation du traitement

Information destinée aux aux spécialistes en oncologie, médecins compétents en cancérologie prescrivant ZYKADIA, aux pharmaciens d'officine et pharmaciens hospitaliers délivrant du ZYKADIA

La posologie recommandée d’initiation du traitement passe de 750 mg une fois par jour à jeun à 450 mg une fois par jour avec de la nourriture

La nouvelle posologie d’initiation de ZYKADIA est présente dans le RCP en vigueur.

En revanche, la notice présente dans les boîtes de ZYKADIA actuellement sur le marché n’inclut pas encore cette modification.

Dans l’attente de l’actualisation de la notice et pour prévenir d’un risque d’erreur médicamenteuse, nous invitons :

- les prescripteurs à indiquer la posologie avec les modalités de prise de ZYKADIA.
- les pharmaciens d’officine et pharmaciens hospitaliers à remettre le feuillet patient informant de la modification de la posologie au patient lors de la délivrance de ZYKADIA

Télécharger le feuillet patient

Céritinib (ZYKADIA ® 150 mg – gélule) - Nouvelle posologie recommandée : La posologie recommandée d’initiation du traitement passe de 750 mg une fois par jour à jeun à 450 mg une fois par jour avec de la nourriture - Lettre aux professionnels de santé