

RISQUES MEDICAMENTEUX - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 04/07/2019 - MIS À JOUR LE 15/04/2021

Modafinil (Modiodal et génériques) : risque potentiel de malformation congénitale en cas d'utilisation pendant la grossesse

Information destinée aux neurologues, psychiatres, gynécologues-obstétriciens, gynécologues, services spécialisés en neurologie et aux centres du sommeil, pharmaciens d'officine et pharmaciens hospitaliers.

A partir des données limitées issues du registre de suivi des grossesses exposées au modafinil aux États-Unis et des cas de pharmacovigilance, l'utilisation du modafinil pendant la grossesse est suspectée être à l'origine de malformations congénitales.

- Le modafinil ne doit pas être utilisé au cours de la grossesse.
- Vous devez vous assurer que toutes les patientes traitées sont informées et ont bien compris :
 - les risques potentiels pour le foetus, associés au traitement par modafinil pendant la grossesse;
 - la nécessité d'utiliser une contraception efficace;
 - que le modafinil peut réduire l'efficacité de la contraception orale et qu'une méthode de contraception alternative ou additionnelle est donc nécessaire.

Modafinil (Modiodal et génériques) : risque potentiel de malformation congénitale en cas d'utilisation pendant la grossesse - Lettre aux professionnels de santé



PUBLIÉ LE 04/07/2019 - MIS À JOUR LE 30/10/2020

Le Modafinil (Modiodal et génériques) ne doit pas être utilisé au cours de la grossesse

PRÉVENTION - MÉDICAMENTS ET GROSSESSE