RISQUES MEDICAMENTEUX - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 12/07/2019 - MIS À JOUR LE 15/04/2021

Fébuxostat : risque accru, chez les patients traités par fébuxostat et présentant des antécédents de maladie cardiovasculaire majeure, de mortalité cardiovasculaire et de mortalité toutes causes confondues (étude CARES)

Information destinée aux médecins généralistes, rhumatologues, orthopédistes, gériatres, internistes, cardiologues, oncologues, hématologues, pharmaciens d'officine et hospitaliers

Le fébuxostat (ADENURIC et génériques) est utilisé dans le traitement de l'hyperuricémie chez les patients atteints de goutte ou chez certains patients traités par chimiothérapie pour des hémopathies malignes. Une récente étude montre que chez les patients ayant des antécédents de maladies cardio-vasculaires majeures (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral ou angor instable), le traitement par fébuxostat est associé à un risque accru de mortalité. Ce traitement doit donc être évité chez ces patients, sauf si aucune autre thérapeutique n'est appropriée.

Une lettre a été adressée aux professionnels de santé afin de les informer des résultats de l'étude et des nouvelles recommandations. Le résumé des caractéristiques du produit et la notice d'information au patient seront prochainement mis à jour.

Fébuxostat : risque accru, chez les patients traités par fébuxostat et présentant des antécédents de maladie cardiovasculaire majeure, de mortalité cardiovasculaire et de mortalité toutes causes confondues (étude CARES) - Lettre aux professionnels de santé