

DEFAUT QUALITE - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 09/02/2021 - MIS À JOUR LE 06/04/2021

PIQRAY® (alpelisib) : Déconditionnement et préparation des boîtes de 50+200 mg pour prévenir les erreurs médicamenteuses liées à l'indisponibilité des comprimés dosés à 150 mg

Information destinée aux oncologues, médecins compétents en cancérologie et pharmaciens hospitaliers

Actuellement la spécialité Piqray 150 mg, comprimé pelliculé (boîte de 56 comprimés) n'est pas disponible.

La posologie recommandée lors de l'initiation d'un traitement par Piqray étant de 300 mg/jour, actuellement 2 boîtes de Piqray 50 + 200 mg, comprimés pelliculés doivent être délivrées pour 28 jours de traitement.

Aussi pour éviter des erreurs de posologie, les pharmacies à usage intérieur doivent reconditionner les boîtes avant toute dispensation de façon à délivrer 1 boîte complète de Piqray 50+200 mg + 1 boîte de Piqray 50+200 mg contenant seulement les comprimés de 50 mg. Pour les autres posologies remise d'1 boîte de Piqray au dosage adapté (Piqray 50+200 mg OU BIEN Piqray 200 mg).

Une Note d'information interministérielle a été diffusée pour préciser les modalités spécifiques de la dispensation en rétrocession par les pharmacies à usage intérieur autorisées à la vente au public (dispositif de prise en charge dérogatoire au titre du post-ATU).

PIQRAY® (alpelisib) : Déconditionnement et préparation des boîtes de 50+200 mg pour prévenir les erreurs médicamenteuses liées à l'indisponibilité des comprimés dosés à 150 mg - Lettre aux professionnels de santé

Note d'information interministérielle (09/02/2021)