

RISQUES MEDICAMENTEUX - VACCINS - PUBLIÉ LE 29/03/2021

## COVID-19 Vaccine AstraZeneca - Risque de thrombocytopénie et de troubles de la coagulation

**Information destinée aux médecins généralistes, centres de vaccination contre la COVID, pharmaciens hospitaliers, pharmaciens de ville, infirmier(ère)s et sages-femmes impliqués dans la campagne de vaccination**

- COVID-19 Vaccine AstraZeneca : les bénéfices l'emportent sur les risques malgré le lien possible avec de très rares cas de caillots sanguins associés à de faibles taux de plaquettes.
- Une association de thrombose et de thrombocytopénie, dans certains cas accompagnés de saignements, a été très rarement observée suite à la vaccination par le COVID-19 Vaccine AstraZeneca.
- Les professionnels de santé doivent être attentifs aux signes et symptômes de thromboembolie et/ou de thrombocytopénie.
- Les personnes vaccinées doivent être informées de consulter immédiatement un médecin si elles développent des symptômes tels qu'un essoufflement, une douleur thoracique, un gonflement des jambes ou une douleur abdominale persistante après la vaccination. En outre, toute personne présentant des symptômes neurologiques, notamment des maux de tête sévères ou persistants, ou une vision floue après la vaccination, ou présentant des ecchymoses (pétéchies) à distance du site d'injection quelques jours après la vaccination, doit rapidement consulter un médecin.

Consultez le courrier à destination des professionnels de santé

+ [COVID-19 Vaccine AstraZeneca – Update on ongoing evaluation of blood clot cases](#)

+ [COVID-19 Vaccine AstraZeneca: benefits still outweigh the risks despite possible link to rare blood clots with low blood platelets](#)



PUBLIÉ LE 26/03/2021 - MIS À JOUR LE 23/04/2021

**Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la COVID-19 -  
Période du 12/03/2021 au 18/03/2021**

**SURVEILLANCE - PHARMACOVIGILANCE**