

RISQUES MEDICAMENTEUX - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 06/04/2021 - MIS À JOUR LE 13/04/2021

Xylocard - Chlorhydrate de lidocaïne anhydre - 20mg/ml et 50mg/ml Rappel des quantités totales de principe actif pour éviter les erreurs médicamenteuses à l'origine de surdosages.

Information destinée aux cardiologues hospitaliers, anesthésistes-réanimateurs, personnels des unités de soins intensifs de cardiologie et d'anesthésie-réanimation, de réanimation et de médecine intensive, pharmaciens hospitaliers

Des erreurs d'administration liées à la confusion entre les concentrations et les quantités de principe actif de Xylocard 50mg/ml ont été signalées, conduisant à des surdosages massifs d'évolution parfois fatale. Ces erreurs médicamenteuses sont liées à une lecture erronée de l'étiquetage avec confusion entre la concentration de principe actif indiquée en mg/ml et la quantité totale de principe actif présente par flacon/ampoule.

Afin d'apporter une meilleure lisibilité de la quantité de principe actif les étiquettes des flacons de Xylocard 50mg/ml et des ampoules de Xylocard 20mg/ml vont être modifiées dès les prochaines productions de ces spécialités.

Xylocard - Chlorhydrate de lidocaïne anhydre - 20mg/ml et 50mg/ml Rappel des quantités totales de principe actif pour éviter les erreurs médicamenteuses à l'origine de surdosages.

PUBLIÉ LE 06/04/2021 - MIS À JOUR LE 12/05/2021

Attention au surdosage avec Xylocard : Ne pas confondre concentration en lidocaïne ET quantité totale de lidocaïne

BON USAGE - ALERTES