

RISQUES MEDICAMENTEUX - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 24/05/2022

Citalopram et Escitalopram (Seropram, Seroplex, génériques) : rappel sur le risque d'allongement dosedépendant de l'intervalle QT

Information destinée aux médecins généralistes, psychiatres, pharmaciens d'officine et pharmaciens hospitaliers

Le citalopram et l'escitalopram :

- Exposent au risque dose-dépendant d'allongement de l'intervalle QT Leurs posologies maximales sont les suivantes :
 - Citalopram : 40 mg par jour chez l'adulte, et 20 mg par jour chez les sujets âgés de plus de 65 ans et/ou présentant une insuffisance hépatique
 - Escitalopram : 20 mg par jour chez l'adulte et 10 mg par jour chez les sujets âgés de plus de 65 ans et/ou présentant une insuffisance hépatique
- Sont contre-indiqués :
 - en association avec d'autres médicaments connus pour induire un allongement de l'intervalle QT, notamment :
 - e les anti-arythmiques de classe IA et III
 - e les antipsychotiques et les antidépresseurs tricycliques
 - **certains agents anti-microbiens** (exemple : sparfloxacine, moxifloxacine, erythromycine IV, pentamidine, traitements anti-paludiques en particulier l'halofantrine),
 - certains anti-histaminiques (astemizole, hydroxyzine, mizolastine), etc.
 - chez les patients présentant un allongement acquis ou congénital de l'intervalle QT
- Doivent être utilisés avec prudence chez les patients à risque, notamment ceux présentant :
 - une bradycardie significative
 - un infarctus aigu du myocarde récent
 - une insuffisance cardiaque non équilibrée
- Nécessitent de corriger des anomalies électrolytiques avant de débuter le traitement (hypokaliémie ou une hypomagnésémie qui augmentent le risque d'arythmie)

Téléchargez le courrier destiné aux professionnels de santé

Téléchargez la liste des médicaments contenant du citalopram ou de l'escitalopram