RISQUES MEDICAMENTEUX - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 29/06/2022 - MIS À JOUR LE 11/08/2022

# Intoxications graves à la colchicine (Colchicine Opocalcium 1 mg et Colchimax) : rappel des règles de bon usage

**Information destinée aux médecins généralistes, rhumatologues, gériatres, cardiologues, néphrologues, hépatologues, internistes, pharmaciens d'officine, pharmaciens hospitaliers et cadres de santé.**

- **Respectez le schéma posologique recommandé dans l'AMM** de ces spécialités ;
- **Diminuez la posologie chez le sujet âgé (notamment de plus de 75 ans), l'insuffisant hépatique, l'insuffisant rénal ou les sujets à risque d'insuffisance rénale** (risques de déshydratation, médicaments concomitants) et assurez un suivi particulier de ces patients ;
- **Respectez les contre-indications :**
  - chez le sujet insuffisant rénal sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min)
  - chez l'insuffisant hépatique sévère
- **Vérifiez les risques d'interactions médicamenteuses** ;
- **N'associez pas la colchicine avec la pristinamycine et les macrolides** (hormis la spiramycine) (**associations contre-indiquées**) ;
- **Pour rappel**, Colchimax contient de la colchicine, du méthylsulfate de tiémonium et de la poudre d'opium. Le méthylsulfate de tiémonium (antipasmodique mixte) et la poudre d'opium sont destinés à limiter l'apparition de phénomènes diarrhéiques provoqués par la colchicine. **Ils peuvent ainsi masquer les diarrhées, un des premiers signes de surdosage** ;
- **Informez les patients sur l'importance** :
  - de **respecter la posologie** ;
  - de **consulter rapidement en cas d'apparition de diarrhée, nausées, vomissements**. Une diminution de la posologie ou un arrêt du traitement devra être envisagé.

Téléchargez le courrier destiné aux professionnels de santé

Recommendations from the French Society of Rheumatology for the management of gout: Management of acute flares (2020)
Recommendations from the French Society of Rheumatology for the management of gout: Urate-lowering therapy (2020)
Updated EULAR evidence-basedrecommendations for the management of gout (2016)