

RISQUES MEDICAMENTEUX - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 06/07/2023

## Bricanyl Turbuhaler et Bricanyl nébuliseur : information importante à transmettre aux patients

## Information destinée aux pharmaciens hospitaliers et pharmaciens d'officine

- Bricanyl doit être utilisé selon les besoins plutôt que régulièrement.
- Les patients doivent contacter rapidement leur médecin :
  - Si les symptômes d'asthme s'aggravent (toux, essoufflement, respiration sifflante ou oppression thoracique) ou s'ils ressentent un essoufflement lorsqu'ils parlent, mangent ou dorment.
  - S'ils ont besoin de doses de Bricanyl plus élevées que d'habitude pour soulager leurs problèmes respiratoires. Ils pourraient alors avoir besoin de médicaments supplémentaires pour contrôler leur asthme.
  - Si Bricanyl est utilisé plus de deux fois par semaine pour traiter les symptômes d'asthme. Cela indique en effet un asthme mal contrôlé et une augmentation du risque de crises sévères d'asthme (aggravation de l'asthme) et de graves complications pouvant mettre en jeu le pronostic vital et conduire au décès. Le médecin pourra alors réévaluer le traitement de l'asthme.
- Si les patients utilisent quotidiennement un médicament contre l'inflammation des poumons, par exemple un corticoïde inhalé, il est important de continuer à l'utiliser régulièrement, même s'ils se sentent mieux.

Téléchargez le courrier destiné aux professionnels de santé