

Ferrostrane 0,68 pour cent, sirop (férédate de sodium) : risque d'erreur médicamenteuse chez les nourrissons de faible poids

Information destinée aux pharmaciens d'officine et hospitaliers, pédiatres, généralistes et aux cadres de santé des services correspondants.

Ferrostrane 0,68 pour cent, sirop (férédate de sodium) est indiqué chez les nourrissons, enfants, adolescents et adultes dans les situations suivantes :

- traitement préventif de la carence martiale de la femme enceinte, du nourrisson prématuré, jumeau ou né de mère carencée, quand un apport alimentaire en fer suffisant ne peut être assuré ;
- anémie par carence martiale (traitement curatif).

Nous attirons votre attention **sur les risques de surdosage et d'erreur médicamenteuse associés à ce produit, en particulier chez les nouveau-nés et nourrissons de faible poids**. En effet, la pipette-doseuse fournie dans la boîte ne permet pas d'administrer la posologie adéquate aux plus petits : elle dispose de graduations de 0,5 en 0,5 mL, alors que dans certaines situations la posologie prescrite n'est pas un multiple de 0,5 mL (par exemple 0,3 mL, 0,7 mL ou 1,3 mL par jour).

Par conséquent, la pipette-doseuse fournie dans la boîte doit être utilisée avec prudence dans ces situations.

Une nouvelle présentation adaptée aux nourrissons est actuellement en cours de développement, avec notamment une pipette-doseuse aux graduations adaptées aux très petits volumes à administrer. Sa mise à disposition est prévue pour 2024.

Dans l'attente, la plus grande vigilance est requise :

- le volume (V) à administrer doit être clairement indiqué sur l'ordonnance (xx mL/jour)
- si V ne peut pas être prélevé avec la pipette fournie dans la boîte, il convient que le pharmacien d'officine et/ou le prescripteur sensibilisent les parents sur les risques de sur/sous dosage et la meilleure façon de prélever le bon volume de médicament.

Consultez le courrier destiné aux professionnels de santé



PUBLIÉ LE 09/11/2023 - MIS À JOUR LE 10/11/2023

La pipette de Ferrostrane est à utiliser avec précaution chez les plus petits

SURVEILLANCE - PHARMACOVIGILANCE

