

RISQUES MEDICAMENTEUX - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 21/03/2024

Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) : rappel des interactions médicamenteuses avec certains immunosupresseurs, notamment le tacrolimus, pouvant être fatales

Information destinée aux médecins généralistes, infectiologues, médecins transplantateurs et spécialistes en thérapie immunosuppressive (hématologues, internistes, néphrologues, hépato-gastroentérologues), spécialistes en pharmacologie clinique, urgentistes, pharmaciens d'officine et hospitaliers

Paxlovid est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints du Covid-19 qui n'ont pas besoin de supplémentation en oxygène et qui présentent un risque accru d'aggravation de la maladie.

Des signalements de cas graves, fataux pour certains, résultant d'interactions médicamenteuses entre Paxlovid et des immunosupresseurs (notamment le tacrolimus) ont conduit le comité de pharmacovigilance (Prac) de l'Agence européenne du médicament à prendre la décision d'alerter les professionnels de santé concernés et de rappeler les recommandations à suivre pour limiter ce risque d'interactions.

Depuis sa commercialisation en mai 2022, l'information produit de Paxlovid a déjà fait l'objet de plusieurs mises à jour pour mettre en garde contre les nombreuses interactions médicamenteuses.

Les prescripteurs sont invités à s'assurer de l'adéquation de leur prescription en consultant systématiquement [le résumé des caractéristiques du produit de Paxlovid](#) et les [recommandations de la Société française de pharmacologie thérapeutique](#)

Consultez le courrier destiné aux professionnels de santé



PUBLIÉ LE 19/02/2024

Retour d'information sur le PRAC de février 2024 (5 - 8 février)

EUROPE - AVIS DU PRAC