RISQUES MEDICAMENTEUX - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 05/02/2025

Spécialités contenant du thiocolchicoside : rappels et nouvelles recommandations concernant le risque potentiel de génotoxicité

Informations destinées aux rhumatologues, médecins généralistes, médecins du sport et de médecine physique, gynécologues, internistes, orthopédistes, médecins de médecine physique et de réadaptation, centres de rééducation fonctionnelle, pharmaciens d'officine et hospitaliers

- Pour rappel, suite à la mise en évidence d'un risque de **génotoxicité** du thiocolchicoside utilisé par voie orale et intramusculaire, celui-ci est **contre-indiqué pendant la grossesse, au cours de l'allaitement, chez les femmes en âge de procréer n'utilisant pas de contraception.**
- **De nouvelles recommandations ont été établies** :
  - Le thiocolchicoside utilisé par voie orale et intramusculaire est **contre-indiqué chez les hommes sans contraception efficace**. Aussi, afin d'éviter tout risque pour le foetus, les patientes en âge de procréer et les hommes doivent être informés de la **nécessité d'une contraception efficace pendant le traitement par thiocolchicoside**.
  - Le thiocolchicoside étant génotoxique, **une contraception efficace** doit être maintenue **après l'arrêt du traitement pendant 1 mois pour les femmes et 3 mois pour les hommes**.

Téléchargez le courrier destiné aux professionnels de santé