


RISQUES MEDICAMENTEUX - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 28/05/2025

Ixchiq, poudre et solvant pour solution injectable Vaccin contre le chikungunya (vivant) : nouvelle contre-indication chez les patients âgés de 65 ans et plus, mise en place pendant la réévaluation européenne du vaccin

Information destinée aux spécialistes en médecine du voyage, aux centres de médecine du voyage, aux médecins généralistes, aux infectiologues, aux gériatres, aux pharmaciens et aux infirmier(e)s diplômés d'Etat

- Au 2 mai 2025, 17 cas d'événements indésirables graves ont été rapportés dans le monde à la suite de l'administration du vaccin Ixchiq chez des personnes âgées de 62 ans à 89 ans.
- À titre de mesure temporaire, et dans l'attente des résultats de l'évaluation approfondie de toutes les données disponibles, le vaccin Ixchiq ne doit pas être utilisé chez les adultes âgés de 65 ans et plus. Le vaccin Ixchiq peut continuer à être utilisé chez les personnes âgées de 12 à 64 ans, conformément aux recommandations officielles.
- Il est rappelé aux professionnels de santé que le vaccin Ixchiq est contre-indiqué chez les personnes immunodéficientes ou immunodéprimées en raison d'une maladie ou d'un traitement médical, indépendamment de leur âge.

Téléchargez le courrier destiné aux professionnels de santé



PUBLIÉ LE 17/04/2025 - MIS À JOUR LE 22/09/2025

Campagne vaccinale contre le chikungunya : point de situation sur la surveillance du vaccin Ixchiq

SURVEILLANCE - PHARMACOVIGILANCE



PUBLIÉ LE 21/05/2025 - MIS À JOUR LE 25/09/2025

Retour d'information sur le PRAC de mai 2025 (5 - 8 mai)

EUROPE - AVIS DU PRAC
