

Xylocard 20 mg/ml, intraveineux solution injectable et Xylocard 50 mg/ml solution injectable pour perfusion : surdosages au cours d'erreurs médicamenteuses, rappels des bonnes pratiques d'utilisation

Information destinée aux cardiologues hospitaliers, anesthésistes-réanimateurs, aux personnels des unités de soins intensifs de cardiologie et d'anesthésie-réanimation, de réanimation et de médecine intensive, pharmaciens de PUI

Actualisation du 27/11/2025

- Une nouvelle version du courrier a été mise à disposition en remplacement de la précédente.

Des cas de surdosages, liés à la confusion entre les concentrations et les quantités totales de principe actif des spécialités Xylocard 20mg/ml et Xylocard 50mg/ml continuent à être rapportés malgré les changements d'étiquetage survenus en juillet 2021. Ces erreurs ont conduit à des surdosages entraînant parfois le décès du patient.

La lettre d'information a pour objectif de rappeler les bonnes pratiques d'utilisation et de stockage des spécialités Xylocard.

Téléchargez le courrier destiné aux professionnels de santé



Rappel

La présentation de **Xylocard 20 mg/ml en ampoule de 5 ml, contenant 100 mg de lidocaïne** par ampoule, est la seule présentation adaptée pour une utilisation en IV directe. **Seule cette présentation peut être stockée dans un chariot d'urgence.**

La présentation **Xylocard 50 mg/ml en flacon de 20 ml, contenant 1000 mg de lidocaïne** par flacon, **ne doit être utilisée, après dilution, qu'en pousse-seringue électrique.**