RISQUES MEDICAMENTEUX - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 06/10/2025

Ambisome liposomal 50 mg et Fungizone 50 mg injectable : attention, ces deux spécialités ne sont pas interchangeables

Information destinée aux infectiologues, internistes, pneumologues, oncologues, hématologues, urgentistes, réanimateurs, pédiatres, pharmaciens hospitaliers, cadres de santé et personnels infirmiers des services hospitaliers concernés.

Ces deux spécialités à base d'amphotéricine B ne sont pas interchangeables : leurs formulations, posologie et protocole de perfusion sont très différents.

- **Ne jamais interchanger Ambisome liposomal et Fungizone injectable**.
- **Mentionner le terme « liposomal » lors de la prescription de la formulation liposomale**, soit en écrivant le nom de marque « Ambisome liposomal » soit en complétant la DCI « Amphotéricine B liposomale ».
- **Vérifier le nom de la spécialité d'amphotéricine B prescrite et la dose prescrite à chaque étape** : prescription, dispensation, préparation et administration.
- **Vérifier les paramètres des logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation** : ils doivent différencier clairement les deux produits. Pour la forme liposomale, ils doivent intégrer la mention « liposomale » à côté du nom « Amphotéricine B » ou « Ambisome ».

Ambisome liposomal Poudre pour dispersion pour perfusion Amphotéricine B liposomale	Fungizone injectable Poudre pour solution injectable Amphotéricine B désoxycholate
• **Dose recommandée : 3 mg/kg/jour** Sauf pour la leishmaniose viscérale pour laquelle la dose cumulative recommandée est de 18 à 24 mg/kg en 6 perfusions. • **Administration en perfusion intraveineuse stricte de 30 à 60 minutes** Si le patient ressent une gêne pendant cette perfusion, la durée de la perfusion peut être prolongée.	• **Dose recommandée : 0,5 mg/kg à 1 mg/kg par jour** • **Administration en perfusion intraveineuse lente (2 à 6 heures)** • **Dose totale journalière maximum : 1,5 mg/kg**

Pour rappel, les modalités de conservation de ces spécialités sont différentes. Avant reconstitution, Ambisome liposomal doit être conservé à une température ne dépassant pas 25 °C, tandis que Fungizone injectable doit être conservé au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C.

Téléchargez le courrier destiné aux professionnels de santé



PUBLIÉ LE 06/10/2025 - MIS À JOUR LE 19/06/2026

Les antifongiques Ambisome liposomal 50 mg et Fungizone 50 mg injectable ne sont pas interchangeables

SURVEILLANCE - PHARMACOVIGILANCE