

# Ambisome liposomal 50 mg et Fungizone 50 mg injectable : attention, ces deux spécialités ne sont pas interchangeables

**Information destinée aux infectiologues, internistes, pneumologues, oncologues, hématologues, urgentistes, réanimateurs, pédiatres, pharmaciens hospitaliers, cadres de santé et personnels infirmiers des services hospitaliers concernés.**

Ces deux spécialités à base d'amphotéricine B ne sont pas interchangeables : leurs formulations, posologie et protocole de perfusion sont très différents.

- **Ne jamais interchanger Ambisome liposomal et Fungizone injectable.**
- **Mentionner le terme « liposomal » lors de la prescription de la formulation liposomale**, soit en écrivant le nom de marque « Ambisome liposomal » soit en complétant la DCI « Amphotéricine B liposomale ».
- **Vérifier le nom de la spécialité d'amphotéricine B prescrite et la dose prescrite à chaque étape** : prescription, dispensation, préparation et administration.
- **Vérifier les paramètres des logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation** : ils doivent différencier clairement les deux produits. Pour la forme liposomale, ils doivent intégrer la mention « liposomale » à côté du nom « Amphotéricine B » ou « Ambisome ».

Ambisome liposomal Poudre pour dispersion pour perfusion Amphotéricine B liposomale	Fungizone injectable Poudre pour solution injectable Amphotéricine B désoxycholate
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Dose recommandée : 3 mg/kg/jour</b> Sauf pour la leishmaniose viscérale pour laquelle la dose cumulative recommandée est de 18 à 24 mg/kg en 6 perfusions.</li> <li>● <b>Administration en perfusion intraveineuse stricte de 30 à 60 minutes</b> Si le patient ressent une gêne pendant cette perfusion, la durée de la perfusion peut être prolongée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Dose recommandée : 0,5 mg/kg à 1 mg/kg par jour</b></li> <li>● <b>Administration en perfusion intraveineuse lente (2 à 6 heures)</b></li> <li>● <b>Dose totale journalière maximum : 1,5 mg/kg</b></li> </ul>

**Pour rappel, les modalités de conservation de ces spécialités sont différentes. Avant reconstitution, Ambisome liposomal doit être conservé à une température ne dépassant pas 25 °C, tandis que Fungizone injectable doit être conservé au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C.**





PUBLIÉ LE 06/10/2025

## Les antifongiques Ambisome liposomal 50 mg et Fungizone 50 mg injectable ne sont pas interchangeables

**SURVEILLANCE** - PHARMACOVIGILANCE