

## Commercialisation d'Eskétamine Renaudin : attention au risque de surdosage en cas de confusion avec les spécialités à base de kétamine

**Information destinée aux anesthésistes-réanimateurs, urgentistes, aux centres de prise en charge de la douleur, aux centres de prise en charge de brûlés, infirmier(e)s anesthésistes et exerçant en service d'urgence, aux médecins et infirmier(e)s exerçant en HAD et aux pharmaciens hospitaliers**

- **Des erreurs médicamenteuses liées à la confusion entre eskétamine et kétamine**, dont les noms sont proches, peuvent conduire à des **surdosages massifs d'eskétamine d'évolution potentiellement fatale, lorsqu'elle est utilisée par erreur à la place de la kétamine.**
- **L'Eskétamine Renaudin et les spécialités génériques à base de kétamine ne sont pas superposables :**
  - **Ni en termes d'indications** (voir le courrier ci-joint) ;
  - **Ni en termes d'effet** : l'eskétamine est l'énantiomère S(+) de la kétamine racémique dont l'effet n'est pas équivalent : 1 mg d'eskétamine n'est pas équivalent à 1 mg de kétamine.
- **Pour éviter ces erreurs médicamenteuses, nous vous recommandons de :**
  - Lire attentivement toutes les mentions figurant sur les boîtes et ampoules, lors de la préparation des solutions de perfusion, en procédant à une **double vérification** ;
  - Eviter la coexistence des spécialités à base d'eskétamine et de kétamine au sein d'un même service.

Téléchargez le courrier destiné aux professionnels de santé

