

PUBLIÉ LE 26/02/2019 - MISE À JOUR LE 06/09/2024

# Amantadine Hydrochloride

Base publique du médicament

| Spécialité(s) pharmaceutique(s)                       |
|---|
| Amantadine Hydrochloride 50 mg/5 ml, solution buvable |
| Substance active                                      |
| Chlorhydrate d'amantadine                             |
| Laboratoire   |
| Alliance Pharmaceuticals Limited                      |
| AMM   |
| Documents de référence dans le cadre de l'AMM         |
| Indication(s) dans ce cadre                           |
| Documents de référence dans ce cadre                  |
| Suivi des patients                                    |

| Titulaire (s)                            |
|--|
| Critères d'octroi                        |
| Indications                              |
| Code(s) CIP                              |
| Documents de référence                   |
| Lire aussi                               |
| Autres informations                      |
| Données d'inclusion                      |
| Résumé de rapport de synthèse périodique |
| Autorisation d'accès compassionnel (AAC) |

# Amantadine Hydrochloride 50 mg/5 ml, solution buvable

### Critères d'octroi

- Maladie de Parkinson, syndrome parkinsonien
- Traumatisme crânien sévère chez un patient en état végétatif ou en état de conscience minimale
- Syndrome catatonique
  - en 2<sup>e</sup> ligne de traitement en cas d'échec des benzodiazépines et si l'ECT ne peut être réalisée rapidement,

- ou en 3<sup>e</sup> ligne de traitement en cas d'échec de l'ECT
- Chez les patients qui ne peuvent pas avaler les capsules de Mantadix

#### **Autres informations**

#### Maladie de Parkinson :

- <u>Cf RCP Mantadix 100 mg, capsule disponible en France dans le cadre d'une AMM Base de données publique du</u> médicament
- Traumatisme crânien sévère chez un patient en état végétatif ou en état de conscience minimale : 100 mg, 2 fois par jour, pendant les deux premières semaines, augmentée à 200 mg, 2 fois par jour la ème semaine, ceci entre la 4ème et la 16ème semaine suivant la lésion cérébrale traumatique
  - Supplementary appendix New England Journal of Medecine
  - Protocol The New England Journal of Medecine

#### Syndrome catatonique :

Traitement par amantadine peut être débuté à la posologie de 100 mg/jour qui peut être augmentée tous les 3 jours de 100 mg/jour, jusqu'à une dose quotidienne maximale de 600 mg.

- Consultez le RCP amantadine sirop 50ml/5ml sur le site de l'EMC
- Information à destination des patients Amantadine sirop 50mg/5ml Alliance

# Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC

## En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par <u>le formulaire dédié</u>