

Inoserp Mena

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

Inoserp Mena, solution pour perfusion

Substance active

Fragments F(ab')₂ d'immunoglobulines spécifiques équine anti venins de serpents

Laboratoire

Inosan Biopharma

AMM

Documents de référence dans le cadre de l'AMM

Indication(s) dans ce cadre

Documents de référence dans ce cadre

Suivi des patients

Base publique du médicament

Titulaire (s)

Critères d'octroi

Indications

Code(s) CIP

Documents de référence

Lire aussi

Autres informations

Données d'inclusion

Résumé de rapport de synthèse périodique

Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

Inoserp Mena, solution pour perfusion

Critères d'octroi

Traitement des patients présentant des signes cliniques d'envenimation par serpent :

- Viperidae: *Echis /eucogaster*, *Echis ocellatus*, *Echis pyramidum*, *Bitis rinhocerus*, *Bitis gabonica*, *Bitis arietans*, *Cerastes cerastes*, *Macrovipera lebetina obtusa*, *Macrovipera deserti*, *Vipera palestinae*.
- Elapidae: *Walterinesia aegyptia*, *Naja melanoleuca*, *Naja haje*, *Naja pallida*, *Naja nigricollis*, *Naja nivea*, *Naja katiensis*

Autres informations

- Contre-indication : hypersensibilité au produit
- Commencer le traitement lorsque sont présents les signes ou symptômes d'envenimation, la dose initiale est de 2 flacons
- Doses supplémentaires : évaluer le patient de près après administration de la dose initiale et si nécessaire, administrer 2 flacons supplémentaires, toutes les 4-6 heures en fonction de l'évolution jusqu'à la rémission des signes d'envenimation.
- Médicament réservé à l'usage hospitalier.



Consulter la traduction française du RCP Marocain (version au 11/12/2020)

Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

[Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC](#)

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par [le formulaire dédié](#)