

Natacyn

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

Natacyn 5%, collyre en suspension

Substance active

Natamycine

Laboratoire

Novartis

AMM

Documents de référence dans le cadre de l'AMM

Indication(s) dans ce cadre

Documents de référence dans ce cadre

Suivi des patients

Base publique du médicament

[Titulaire \(s\)](#)

[Critères d'octroi](#)

[Indications](#)

[Code\(s\) CIP](#)

[Documents de référence](#)

[Lire aussi](#)

[Autres informations](#)

[Données d'inclusion](#)

[Résumé de rapport de synthèse périodique](#)

Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

Natacyn 5%, collyre en suspension

[Critères d'octroi](#)

- Kéратite fongique
- Ou Abcès cornéen fongique
- Ou Endophtalmie fongique

- Avec caractérisation : *Candida, Aspergillus, Cephalosporium, Fusarium, Penicillium*
- En cas de suspicion sans caractérisation, fournir la date de mise en culture et le délai d'obtention des résultats.

Autres informations

- [RCP Etats-Unis - Site Novartis](#)

Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

[Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC](#)

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par [le formulaire dédié](#)