PUBLIÉ LE 10/09/2018 - MISE À JOUR LE 16/05/2025

Gabaliquid/Neurontin

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

Gabaliquid GeriaSan 50 mg/ml, solution buvable
Neurontin 250 mg/ 5ml, solution buvable

Substance active

Gabapentine

Laboratoire

Gabaliquid : Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH
Neurontin : Viatris

AMM

Documents de référence dans le cadre de l’AMM

Indication(s) dans ce cadre

Documents de référence dans ce cadre

Suivi des patients

Base publique du médicament

Titulaire (s)

Critères d'octroi

Indications

Code(s) CIP

Documents de référence

Lire aussi

Autres informations

Données d'inclusion

Résumé de rapport de synthèse périodique

Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

Gabaliquid GeriaSan 50 mg/ml, solution buvable
Neurontin 250 mg/ 5ml, solution buvable

Critères d'octroi

- Douleurs neuropathiques périphériques réfractaires aux autres antalgiques
- Traitement prophylactique des douleurs neuropathiques pendant une chimiothérapie par antiGD2
- Ou Epilepsies partielles avec ou sans généralisation secondaire en monothérapie (chez l'adulte et l'adolescent à

partir de 12 ans) ou en association (chez l'adulte et l'enfant à partir de 6 ans)

- Chez les patients ne pouvant avaler les comprimés

Autres informations

- **Attention : les excipients des spécialités sont différents**
- **Pour Neurontin 250 mg/5 ml**
  - L'administration de ce médicament nécessite l'utilisation d'un système doseur adapté au volume prescrit, non inclus dans l'actuelle présentation.
  - Consulter le RCP - Etats - Unis - Site FDA
- **Pour Gabaliquid 50 mg/ml**
  - La boîte contient une seringue doseuse graduée de 10 ml avec des graduations par incréments de 0,5 ml et un adaptateur de bouteille inclus dans la présentation (6 ml=300mg).
  - Consulter le RCP et la notice au sein du PUT
  - Excipients à effet notoire : GabaLiquid GeriaSan contient de l'alcool benzylique (0,08 mg/ml), du propylène glycol (42,85 mg/ml, du sodium (moins de 1 mmol/ml) et de l'éthanol (alcool) 0,015 mg/ml.
    La quantité d'alcool dans ce médicament n'a pas d'effet perceptible. La quantité de sodium (23 mg) peut être considérée comme « sans sodium ». Du fait de la présence du propylène glycol ce médicament ne doit pas être administré sans avis médical en cas de grossesse et allaitement ou d'atteinte rénal ou hépatique.
- Il existe une forme Neurontin 100 mg, gélule avec une AMM en France.
- Posologie dans le traitement prophylactique des douleurs neuropathiques pendant une chimiothérapie par antiGD2 : se référer au RCP du médicament antiGD2 concerné.

AAC Gabaliquid – PUT-SP (28/03/2023)

Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par le formulaire dédié