

Nuplazid

Actualisation du 22/04/2026

Mise à jour des critères d'octroi de l'AAC et publication du PUT

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

Nuplazid 10 mg, comprimé

Nuplazid 34 mg, gélule

Substance active

pimavanserine

Laboratoire

Acadia Pharmaceuticals Inc.

AMM

Documents de référence dans le cadre de l'AMM

Indication(s) dans ce cadre

Documents de référence dans ce cadre

[Suivi des patients](#)

[Base publique du médicament](#)

[Titulaire \(s\)](#)

[Critères d'octroi](#)

[Indications](#)

[Code\(s\) CIP](#)

[Documents de référence](#)

[Lire aussi](#)

[Autres informations](#)

[Données d'inclusion](#)

[Résumé de rapport de synthèse périodique](#)


Nuplazid 10 mg, comprimé
Nuplazid 34 mg, gélule

Critères d'octroi

- Hallucinations et idées délirantes sévères associées à la maladie de Parkinson en cas d'échec aux traitements disponibles.
- Hallucinations et idées délirantes sévères associés à la maladie à corps de Lewy en cas d'échec aux traitements disponibles.

Autres informations

- Posologie : 34 mg par jour ou 10 mg par jour en cas d'interaction médicamenteuse avec des inhibiteurs puissants de CYP3A4.
- **Risque d'allongement du QT et de toxicité cardiovasculaire** : L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée chez les patients ayant un allongement préexistant de l'intervalle QT ou en association avec d'autres médicaments susceptibles d'allonger l'intervalle QT tels que les antiarrhythmiques de classe 1A (par exemple, quinidine, hydroquinidine) ou de classe 3 (par exemple amiodarone, sotalol), certains antipsychotiques (par exemples dérivés de la phénothiazine, sertindole, pimozide, ziprasidone) et certains antibiotiques (par exemple azithromycine, clarithromycine, érythromycine, lévofloxacine, moxifloxacine, télichromycine). Par conséquent, le prescripteur devra envisager la mise en place d'un suivi cardiologique approprié.
- La dose doit être adaptée en cas d'association avec des médicaments inhibiteur puissant du CYP3A4 et il convient d'éviter d'administrer le Nuplazid avec des inducteurs puissants ou modérés du CYP3A4
- **Risque accru de décès chez les patients âgés atteints de psychose en relation avec une démence** : les patients âgés atteints de psychose liée à la démence et traités par des médicaments antipsychotiques présentent un risque accru de décès. Nuplazid n'est pas approuvé pour le traitement des patients atteints de psychose liée à la démence sans rapport avec les hallucinations et les délires associés à la psychose de la maladie de Parkinson
- Prescription réservée aux neurologues, psychiatres et gériatres.
- Consultez le RCP US :

 AAC Nuplazid – RCP US (10/12/2025)

- Consultez le PUT-SP

 AAC Nuplazid – PUT-SP (22/04/2026)

Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

[Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC](#)

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par [le formulaire dédié](#)