

PUBLIÉ LE 09/02/2022 - MISE À JOUR LE 29/08/2023

Nuplazid

Spécialité(s) pharmaceutique(s)
Nuplazid 10 mg, comprimé Nuplazid 34 mg, gélule
Substance active
pimavanserine
Laboratoire
Acadia Pharmaceuticals Inc.
AMM
Documents de référence dans le cadre de l'AMM
Documents de reference dans le cadre de l'AMM
Indication(s) dans ce cadre
Documents de référence dans ce cadre
Suivi des patients

Titulaire (s)
Critères d'octroi
Indications
Code(s) CIP
Documents de référence
Lire aussi
Autres informations
Données d'inclusion
Résumé de rapport de synthèse périodique
Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

Nuplazid 10 mg, comprimé Nuplazid 34 mg, gélule

Critères d'octroi

Traitement des Hallucinations et idées délirantes sévères associés à la maladie de Parkinson en cas d'échec aux traitements disponibles.

Autres informations

- Consulter le RCP Nuplazid US
- Posologie: 34 mg par jour ou 10 mg par jour en cas d'interaction médicamenteuse avec des inhibiteurs puissants de CYP3A4.
- Risque d'allongement du QT et de toxicité cardiovasculaire: L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée chez les patients ayant un allongement préexistant de l'intervalle QT ou en association avec d'autres médicaments susceptibles d'allonger l'intervalle QT tels que les antiarrhythmiques de classe 1A (par exemple, quinidine, hydroquinidine) ou de classe 3 (par exemple amiodarone, sotalol), certains antipsychotiques (par exemples dérivés de la phénothiazine, sertindole, pimozide, ziprasidone) et certains antibiotiques (par exemple azithromycine, clarithromycine, érythromycine, lévofloxacine, moxifloxacine, télithromycine). Par conséquent, le prescripteur devra envisager la mise en place d'un suivi cardiologique approprié.
- La dose doit être adaptée en cas d'association avec des médicaments inhibiteur puissant du CYP3A4 et il convient d'éviter d'administrer le Nuplazid avec des inducteurs puissant ou modérés du CYP3A4
- Risque accru de décès chez les patients âgés atteints de psychose en relation avec une démence : Les patients âgés atteints de psychose liée à la démence et traités par des médicaments antipsychotiques présentent un risque accru de décès. Nuplazid n'est pas approuvé pour le traitement des patients atteints de psychose liée à la démence sans rapport avec les hallucinations et les délires associés à la psychose de la maladie de Parkinson
- Prescription réservée aux neurologues, psychiatres et gériatres .

Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par <u>le formulaire dédié</u>