

# PMS - Oxybutynin

## Spécialité(s) pharmaceutique(s)

**PMS - Oxybutynin 1 mg/mL suspension buvable**

## Substance active

Chlorhydrate d'oxybutynine

## Laboratoire

Pharmascience

## AMM

## Documents de référence dans le cadre de l'AMM

## Indication(s) dans ce cadre

## Documents de référence dans ce cadre

## Suivi des patients

## Base publique du médicament

Titulaire (s)

Critères d'octroi

Indications

Code(s) CIP

Documents de référence

Lire aussi

Autres informations

Données d'inclusion

Résumé de rapport de synthèse périodique

#### Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

##### **PMS - Oxybutynin 1 mg/mL suspension buvable**

##### Critères d'octroi

- Trouble de la miction lié à une vessie neurogène
- Ou instabilité vésicale
- Ou Hyperhidrose dans le cadre d'une neuropathie

- En cas d'allergie au lactose (en alternative aux comprimés de Ditropan)
- Ou chez les patients qui ne peuvent pas avaler les comprimés

## Autres informations

### Posologie

- Chez l'adulte : 5 mg 2 à 3 fois par jour (max 3 fois par jour)
- Chez l'enfant : 5 mg 2 fois par jour
- [RCP Canada - Site Gouvernement Canada](#)

## Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

[Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC](#)

## En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par [le formulaire dédié](#)