

PMS - Oxybutynin

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

PMS - Oxybutynin 1 mg/mL suspension buvable

Substance active

Chlorhydrate d'oxybutynine

Laboratoire

Pharmascience

AMM

Documents de référence dans le cadre de l'AMM

Indication(s) dans ce cadre

Documents de référence dans ce cadre

Suivi des patients

Base publique du médicament

[Titulaire \(s\)](#)

[Critères d'octroi](#)

[Indications](#)

[Code\(s\) CIP](#)

[Documents de référence](#)

[Lire aussi](#)

[Autres informations](#)

[Données d'inclusion](#)

[Résumé de rapport de synthèse périodique](#)

Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

PMS - Oxybutynin 1 mg/mL suspension buvable

[Critères d'octroi](#)

- Trouble de la miction lié à une vessie neurogène
- Ou instabilité vésicale
- Ou Hyperhidrose dans le cadre d'une neuropathie

- En cas d'allergie au lactose (en alternative aux comprimés de Ditropan)
- Ou chez les patients qui ne peuvent pas avaler les comprimés

Autres informations

Posologie

- Chez l'adulte : 5 mg 2 à 3 fois par jour (max 3 fois par jour)
- Chez l'enfant : 5 mg 2 fois par jour
- [RCP Canada - Site Gouvernement Canada](#)

Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

[Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC](#)

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par [le formulaire dédié](#)