PUBLIÉ LE 10/09/2018 - MISE À JOUR LE 20/10/2026

Rimso-50

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

Rimso-50, solution d’instillation intravésicale

Substance active

diméthyl sulfoxide

Laboratoire

Viatris

AMM

Documents de référence dans le cadre de l’AMM

Indication(s) dans ce cadre

Documents de référence dans ce cadre

Suivi des patients

Base publique du médicament

Titulaire (s)

Critères d'octroi

Indications

Code(s) CIP

Documents de référence

Lire aussi

Autres informations

Données d'inclusion

Résumé de rapport de synthèse périodique

Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

Rimso-50, solution d’instillation intravésicale

Critères d'octroi

- Cystite interstitielle après échec d’Elmiron

Autres informations

- Posologie :
  - Administration par injection intravésicale ;
  - 50 ml toutes les 2 semaines pendant 6 semaines jusqu'au soulagement des symptômes puis espacement des injections.
- Les injections intravésicales de Rimso-50 doivent être réalisées par une équipe médicale expérimentée.
- Un bilan biochimique est recommandé tous les 6 mois notamment pour surveiller les paramètres hépatiques et rénaux et la NFS.

Consultez le RCP US (08/02/2023)

Faire une demande d'AAC (autorisation d’accès compassionnel)

Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l’application e-saturne** doivent désormais passer par le formulaire dédié