

# Vistogard

## Spécialité(s) pharmaceutique(s)

**Vistogard 10 g, granulés en sachet**

## Substance active

Uridine Triacetate

## Laboratoire

BTG International Inc US

## AMM

## Documents de référence dans le cadre de l'AMM

## Indication(s) dans ce cadre

## Documents de référence dans ce cadre

## Suivi des patients

## Base publique du médicament

Titulaire (s)

Critères d'octroi

Indications

Code(s) CIP

Documents de référence

Lire aussi

Autres informations

Données d'inclusion

Résumé de rapport de synthèse périodique

#### Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

**Vistogard 10 g, granulés en sachet**

Critères d'octroi

- Intoxication au 5 FU et à la capécitabine

Autres informations

- Posologie

- Adulte : 1 sachet (10 g) toutes les 6 heures pour un total de 20 doses
- Pédiatrie : 6.2 g/m<sup>2</sup> toutes les 6 heures pour un total de 20 doses
- Vistogard doit être administré au plus tard 96 heures après l'intoxication. Aucune donnée sur une administration au-delà des 96h n'est disponible.
- Commande en urgence : SERB Tel/contact 24h/24 et 7j/701 73 03 20 00.



RCP Etats-Unis (version 10/2023)

### Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC

### En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par le formulaire dédié