

# Dupixent

## Spécialité(s) pharmaceutique(s)

**Dupixent 200 mg, solution injectable en seringue préremplie**  
**Dupixent 300 mg, solution injectable en seringue préremplie**

## Substance active

Dupilumab

## Laboratoire

Sanofi Winthrop Industrie

## AMM

## Documents de référence dans le cadre de l'AMM

## Indication(s) dans ce cadre

## Documents de référence dans ce cadre

## Suivi des patients

Base publique du médicament

Titulaire (s)

Critères d'octroi

Indications

Code(s) CIP

Documents de référence

Lire aussi

Autres informations

Données d'inclusion

Résumé de rapport de synthèse périodique

**Autorisation d'accès compassionnel (AAC)**

Fin d'ATUn le 29/04/2021

**Dupixent 200 mg, solution injectable en seringue préremplie**  
**Dupixent 300 mg, solution injectable en seringue préremplie**

Indication de l'AAP octroyée le 27/10/2022, renouvelée le 05/10/2023 et arrêtée le 14/12/2023

Traitement de la dermatite atopique sévère de l'enfant âgé de 6 mois à 5 ans qui nécessite un traitement systémique

---

**Dupixent 300 mg, solution injectable en seringue préremplie**

Indication de l'AAP octroyée le 07/09/2022, renouvelée le 21/09/2023 et arrêtée le 01/05/2024

Traitement du prurigo nodulaire modéré à sévère de l'adulte qui nécessite un traitement systémique

---

**Dupixent 300 mg, solution injectable en seringue préremplie**

Indication de l'AAP refusée le 10/01/2023

Autorisation d'accès précoce refusée à la spécialité Dupixent (dupilumab) dans l'indication suivante : « traitement de l'oesophagite à éosinophiles chez les adultes et les adolescents âgés de plus de 12 ans et pesant au moins 40 kg en cas d'échec, de contre-indication ou d'intolérance aux traitements médicamenteux conventionnels. »

- [Consulter la décision de la HAS](#)

↓ Avis de l'ANSM pour la demande d'AAP de Dupixent pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles (13/01/2023)

---

**Dupixent 300 mg, solution injectable en seringue préremplie**

Indication de l'AAP refusée le 10/10/2024

Chez les adultes en traitement de fond additionnel de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) caractérisée par un taux élevé d'éosinophiles sanguins, non contrôlée par l'association corticoïdes inhalés (CSI), bêta-2-agoniste à longue durée d'action (LABA) et antagoniste muscarinique de longue durée d'action (LAMA) ou par l'association LABA/LAMA seule si les CSI ne sont pas adaptés

- [Consulter la décision de la HAS](#)