

# Tedopi

## Spécialité(s) pharmaceutique(s)

**Tedopi 5,0 mg/mL émulsion pour injection sous cutanée**

## Substance active

10 peptides synthétiques ciblant 5 antigènes tumoraux (Antigène Carcino-embryonnaire (ACE), Récepteur 2 du Facteur de croissance Epidermique Humain (HER-2), Antigène A2 du Mélanome (MAGE-2), Antigène A3 du Mélanome (MAGE-3), Tumeur Protéine 53 (P53)).

## Laboratoire

OSE Immunotherapeutics

## AMM

## Lire aussi

## Autres informations

## Résumé de rapport de synthèse périodique

### Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

**Tedopi 5,0 mg/mL émulsion pour injection sous cutanée**

## Critères d'octroi

- Absence de critères d'octroi. Justifier la demande.

## Autres informations

- Consulter la brochure investigateur disponible auprès du laboratoire. Posologie :Administration par voie sous-cutanée toutes les trois semaines pour les six premières doses, puis toutes les huit semaines pendant le reste de la première année, puis toutes les douze semaines jusqu'à progression ou toxicité. Le patient doit être surveillé pendant au moins 4 heures après chaque injection.
- Prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie.
- Réserve hospitalière.

## Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

[Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC](#)

## En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par [le formulaire dédié](#)

## Autorisation d'accès précoce (AAP)

### **Tedopi 5,0 mg/mL émulsion pour injection sous cutanée**

#### **Indication de l'AAP refusée le 02/02/2023**

En monothérapie pour des patients adultes HLA-A2 atteints de cancer bronchique non à petites cellules, localement avancé (non opérable et non éligible à la radiothérapie) ou métastatique sans altération des gènes EGFR et ALK : en 3ème ligne de traitement après échec d'une 1ère ligne de chimiothérapie puis d'une 2ème ligne de traitement avec un inhibiteur de point de contrôle immunitaire administré en monothérapie pendant au moins 12 semaines.

- [Décision de refus de la HAS](#)

 Avis de l'ANSM sur le médicament Tedopi 5,0 mg/mL émulsion pour injection sous cutanée dans le cadre d'une demande d'AAP (27/02/2023)