

PUBLIÉ LE 16/01/2024 - MISE À JOUR LE 03/09/2025

Botensilimab

Spécialité(s) pharmaceutique(s)
Botensilimab 50 mg/ml, solution à diluer pour perfusion
Substance active
botensilimab
Laboratoire
Agenus Inc.
AMM
Lire aussi
Autres informations
Résumé de rapport de synthèse périodique
Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

Botensilimab 50 mg/ml, solution à diluer pour perfusion

Critères d'octroi

Traitement, en association avec Balstilimab, des patients adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique

- statut MSS (stabilité microsatellitaire),
- absence de métastase hépatique active,
- en progression après tous les traitements standards appropriés et pour lesquels aucune autre option satisfaisante n'est disponible ou recommandée.

Les patients doivent :

- avoir été traités par chimiothérapie à base de fluoropyrimidine, d'oxaliplatine et d'irinotécan,
- avoir été traités ou être inéligibles à un traitement anti-VEGF, si le patient est RAS de type sauvage par un traitement anti-EGFR et si le patient a une mutation BRAF V600E, un inhibiteur de BRAF,
- avoir progressé après un traitement par trifluridine-tipiracil, ou être intolérant à ce traitement
- et avoir progressé après un traitement par régorafenib, ou être intolérant à ce traitement.

En dehors de ces critères, justifier la demande.

Autres informations

- Administration intraveineuse.
- Posologie:
 - Botensilimab 75 mg par voie intraveineuse (IV) une administration toutes les 6 semaines (Q6W) pour un total de 4 administrations (24 semaines de traitement) en association avec Balstilimab 240 mg par voie IV une fois toutes les 2 semaines (Q2W).
- Consulter la dernière version de la brochure destinée à l'investigateur (BI) disponible auprès du laboratoire.
- Il est indispensable que soit mis en œuvre un suivi au moins équivalent à celui recommandé dans le cadre des essais cliniques actuellement en cours en France, notamment l'essai clinique C-800-25 (n° EUDRACT 2022-502065-23-00): « Étude de phase 2, randomisée, en ouvert, visant à évaluer le botensilimab (AGEN1181) en monothérapie et en association avec le balstilimab (AGEN2034) ou le traitement standard choisi par l'investigateur (régorafénib, ou trifluridine associée au tipiracil) pour le traitement du cancer colorectal métastatique réfractaire».
- Médicament réservé à l'usage hospitalier.
- Prescription réservée aux spécialistes en oncologie et aux médecins compétents en cancérologie.

Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par <u>le formulaire dédié</u>