

Tétradécyl sulfate de sodium

Substance active

Tétradécyl sulfate de sodium

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

Fibrovein, solution injectable


Générique(s) disponible(s)

Non

Mesures additionnelles de réduction du risque validées par l'ANSM et diffusées par le(s) laboratoire(s) exploitant(s) le(s) médicament(s)

Guide de prescription de Fibrovein 0,2%, 0,5%, 1% et 3% destiné aux professionnels de santé expérimentés en anatomie veineuse, diagnostic et traitement des pathologies affectant le système veineux et préalablement formés à la technique d'injection.

- Il informe sur les risques liés à l'utilisation de FIBROVEIN lors de la pratique d'une sclérothérapie : hypersensibilité, évènements thromboemboliques, erreurs médicamenteuses et effets indésirables neurologiques.
- Il rappelle la nécessité d'informer les patients sur les risques.
- Il décrit les bonnes pratiques et instructions pour la préparation et l'administration de la mousse.
- Il rappelle l'importance de la surveillance/suivi du patient pendant et après l'injection.

 Guide de prescription de Fibrovein 0,2%, 0,5%, 1% et 3% destiné aux professionnels de santé (04/07/2024)

Base publique du médicament

Données BDPM

Lire aussi

