

Fosphénytoïne sodique

Substance active

Fosphénytoïne sodique

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

Prodilantin 75 mg/ml, solution à diluer pour perfusion / solution injectable

Générique(s) disponible(s)

Non

Mesures additionnelles de réduction du risque validées par l'ANSM et diffusées par le(s) laboratoire(s) exploitant(s) le(s) médicament(s)

2 guides posologiques destinés au traitement d'urgence de l'état de mal épileptique, disponibles dans les boîtes du médicament :

- un guide pour l'administration chez l'enfant âgé de 5 ans et plus uniquement
- un guide pour l'administration chez l'adulte

Ces guides détaillent les modalités d'administration de doses de charge : ils ont pour objectif de réduire les risques d'erreurs médicamenteuses, en particulier en situation d'urgence, dans le traitement de l'état de mal épileptique.

[!\[\]\(95b425611cbd2b8716a140cf67c81822_img.jpg\) Guide pour l'administration chez l'enfant \(10/10/2024\)](#)

[!\[\]\(b4eeff342f60cc7bcd67d869b4fedca2_img.jpg\) Guide pour l'administration chez l'adulte \(10/10/2024\)](#)

Base publique du médicament

[Données BDPM](#)

Lire aussi