PUBLIÉ LE 30/06/2020 - MISE À JOUR LE 03/02/2022

Vaxelis

Indication

Diphtérie - Tétanos - Poliomyélite - Coqueluche - Infections à Haemophilus influenza de type b - Hépatite B

Description

Vaccin hexavalent : anatoxine diphtérique, anatoxine tétanique, antigènes de Bordetella pertussis, virus poliomyélitique (inactivé), antigène de surface de l’hépatite B, polyoside d’Haemophilus influenzae type b

Principe actif

Excipients

Laboratoire exploitant

Doses

Conditions de conservation

Développement clinique

 <ul style="list-style-type: disc;"> Résumé EPAR en français à l’intention du public –Site EMA Tous les Rapports d’évaluation (Assessment history) – <a href="http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?

curl=pages/medicines/human/medicines/003982/human_med_001962.jsp&mid=WC0b01ac058001d124" target="_blank" rel="noopener">EPARs - Site EMA

Pays qui réalise la libération des lots

Documents de référence

RCP – Notice - Site EMA

Informations règlementaires et administratives

Répertoire des spécialités pharmaceutiques

Informations de sécurité publiées par l'ANSM

Données de sécurité des vaccins obligatoires pour les enfants vaccinés avant l’âge de 2 ans en 2018 (bilan au 30 juin 2019) – Rapport (30/06/2020)

Données de sécurité des vaccins obligatoires pour les enfants vaccinés avant l’âge de 2 ans entre 2012 et 2017 (Bilan au 30 juin 2019 (30/06/2020)

La sécurité des vaccins obligatoires chez les enfants de moins de 2 ans - Données de la base nationale de pharmacovigilance pour les enfants vaccinés en 2018 (30/06/2020)

Recommandations vaccinales

<ul style="list-style-type: disc;"> Calendrier simplifié des vaccinations - 2020 - Site Santé Publique France Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2020 - Site Ministère en charge de la santé <ul style="list-style-type: disc;"> Utilisation du vaccin hexavalent Vaxelis pour la vaccination des nourrissons - Site HAS Avis de la HAS

Information complémentaire

Données épidémiologiques

Données épidémiologiques – Site Santé Publique France

Nombre de participants dans l’essai clinique

Composition

Efficacité