

Comirnaty adulte à diluer (Pfizer & BioNTech)

Indication

Comirnaty est indiqué pour l'immunisation active pour la prévention de la COVID-19 causée par le virus SARS-CoV-2, chez les personnes âgées de 12 ans et plus.

Description

Comirnaty contient une molécule appelée ARN messenger (ARNm) comprenant des instructions pour la production d'une protéine à partir du SARS-CoV-2, le virus qui provoque la COVID-19. Comirnaty ne contient pas le virus lui-même et ne peut provoquer la COVID-19.

Principe actif

Le tozinaméviran est un ARN messenger (ARNm) simple brin à capoté, produit et aidé d'une transcription in vitro sans cellule à partir des matrices d'ADN correspondantes et codant pour la protéine Spike (S) virale du SARS-CoV-2.

Excipients

- ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldécanoate) (ALC-0315)
- 2-[(polyéthylène glycol)-2000]-N, N-ditétrahydrocylactamide (ALC-0159)
- 1,2-Distéaroyl-sn-glycéro-3-phosphocholine (DSPC)
- Cholestérol
- Chlorure de potassium
- Phosphate monopotassique
- Chlorure de sodium
- Phosphate disodique dihydraté
- Saccharose
- Eau pour préparations injectables
- Hydroxyde de sodium (pour ajustement du pH)
- Acide chlorhydrique (pour ajustement du pH)

Laboratoire exploitant

Pfizer

Doses

2 doses, 21 jours d'intervalle, en intramusculaire
[Retrouvez les recommandations nationales sur le rappel vaccinal sur le site du gouvernement](https://www.gouvernement.fr/tout-savoir-sur-le-rappel-vaccinal-contre-la-covid-19)



Avis de l'ANSM concernant la seconde dose du vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNtech (07/01/2021)

Conditions de conservation

Flacon congelé;
<ul style="list-style-type: chevron;"> Pendant 12 mois entre -90°C et -60°C au congélateur **Flacon décongelé;**
<ul style="list-style-type: chevron;"> Une fois décongelé, le flacon peut être conservé jusqu'à 1 mois entre 2°C et 8°C. Avant utilisation, le flacon non ouvert peut être conservé pendant un maximum de 2 heures des températures allant jusqu'à 30°C. **Vaccin dilué;**
<ul style="list-style-type: chevron;"> Après dilution, la stabilité physico-chimique en cours d'utilisation a été démontrée pendant 6 heures entre 2°C et 30°C. Consultez le RCP Comirnaty - Site de l'EMA

Développement clinique

<ul style="list-style-type: disc;"> Essais cliniques de phase II/III : 44000 participants, environ 95 % d'efficacité sur la souche historique (Wuhan) Début de la rolling review le 06/10/2020 AMM le 21/12/2020
 <ul style="list-style-type: disc;"> Document assessment report En savoir plus : Site de l'EMA

Pays qui réalise la libération des lots

Allemagne, Belgique

Documents de référence

<ul style="list-style-type: chevron;"> Information produit (RCP) Risk management plan

Informations réglementaires et administratives

Informations de sécurité publiées par l'ANSM

Recommandations vaccinales

Information complémentaire

<ul style="list-style-type: disc;"> FAQ FAQ

[Extra dose from vials of Comirnaty COVID-19 vaccine](https://www.ema.europa.eu/en/news/extra-dose-vials-comirnaty-covid-19-vaccine) Des documents pratiques sur la manipulation, reconstitution et administration sont disponibles sur comirnatyglobal.com Site de la Commission européenne

Données épidémiologiques

Composition

Le médicament est fourni dans un flacon multidose et doit être dilué avant utilisation.
Un flacon (0,45 ml) contient 6 doses de 0,3 ml après dilution.
Une dose (0,3 ml) contient 30 microgrammes de tozinaméran, un vaccin à ARNm contre la COVID-19 (encapsulé dans des nanoparticules lipidiques).

Attention au risque de confusion entre les flacons du vaccin Comirnaty adultes pour les 12 ans et plus à diluer (bouchon violet), pour les 12 ans et plus déjà dilué, prêt à l'emploi (bouchon gris), les flacons du vaccin pédiatrique pour les 5-11 ans à diluer (bouchon orange) et les flacons du vaccin pédiatrique pour les 6 mois-4 ans à diluer (bouchon bordeaux).

Pour prévenir ce risque, nous mettons à votre disposition une affiche de prévention à télécharger et imprimer (formats A3 et A4).

Affiche format A3



Affiche format A4



Attention au risque de confusion entre les flacons du vaccin Comirnaty (Pfizer BioNTech) et les flacons de solvant (chlorure de sodium)

Des erreurs ayant conduit à l'administration de solvant seul à la place du vaccin Comirnaty dilué, ont en effet été remontées à l'ANSM.

Pour prévenir ce risque, nous mettons à votre disposition une affiche de prévention à télécharger et imprimer (formats A3 et A4).

Affiche format A3



Affiche format A4



Vaccins à ARNm contre la COVID-19 Comirnaty et Spikevax : risque de myocardite et de péricardite

Information destinée aux médecins généralistes, médecins réanimateurs, cardiologues, spécialistes en médecine interne, médecine d'urgence, centres de vaccination contre la COVID, pédiatre, médecin du travail, infirmier(ère), sages-femmes impliqués dans la campagne de vaccination, pharmaciens d'officine et hospitaliers
