

COVID-19 Vaccine Janssen

Indication

COVID-19 Vaccine Janssen est indiqué pour l'immunisation active afin de prévenir la COVID-19 causée par le SARS-CoV-2 chez les personnes âgées de 18 ans et plus.

Description

COVID-19 vaccine (Ad26.COVS-S [recombinant]), vecteur viral Ad26 exprimant la protéine S, non répliquatif.

COVID-19 Vaccine Janssen est constitué d'un autre virus (de la famille des adénovirus) qui a été modifié de façon à contenir le gène permettant de produire une protéine présente sur le SARS-CoV-2. COVID-19 Vaccine Janssen ne contient pas le virus lui-même et ne peut pas provoquer la COVID-19.

Laboratoire exploitant

Doses

1 dose, en intramusculaire

Conditions de conservation

2°C à 8°C

Développement clinique

- Essais cliniques : 44000 participants, environ 67% d'efficacité;
- Début de la rolling review le 01/12/2020
- AMM le 11/03/2021

- [Assessment report](https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/covid-19-vaccine-janssen-epar-public-assessment-report_en.pdf)
- [En savoir plus : Site EMA](https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-janssen)

-

Pays qui réalise la libération des lots

En attente

Documents de référence

- [Information produit \(RCP\)](https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-janssen#product-information-section)
- [Risk management plan](https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/covid-19-vaccine-janssen-epar-risk-management-plan_en.pdf)

Informations règlementaires et administratives

Informations de sécurité publiées par l'ANSM

Recommandations vaccinales

Information complémentaire

- [FAQ](https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/covid-19-vaccine-janssen-epar-medicine-overview_fr.pdf)
- [Site de la Commission européenne](https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1525.htm)

Données épidémiologiques

RISQUES MEDICAMENTEUX - VACCINS - PUBLIÉ LE 30/04/2021

COVID-19 Vaccine Janssen : lien entre le vaccin et la survenue de thromboses en association avec une thrombocytopenie

Information destinée aux médecins généralistes, médecins réanimateurs, spécialistes en médecine interne, hématologie, médecine d'urgence, centres de vaccination contre la COVID, pharmaciens hospitaliers, pharmaciens de ville, infirmier(ère) et sages-femmes impliqués dans la campagne de vaccination.

COVID-19 Vaccine Janssen : Contre-indication chez les personnes ayant des antécédents de syndrome de fuite capillaire et mise à jour concernant le syndrome de thromboses associées à une thrombocytopénie

Syndrome de fuite capillaire (SFC)

Syndrome de thromboses associées à une thrombocytopénie
