

Si l'un de ces symptômes apparaît :

- Cesser l'injection de pegvaliase
- Utiliser le dispositif d'injection d'adrénaline en suivant les instructions du médecin
- Demander une assistance médicale d'urgence ou se rendre à un centre médical d'urgence le plus proche

À L'ATTENTION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Pour obtenir plus d'informations sur le pegvaliase, veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit. Veuillez déclarer tout effet indésirable suspecté auprès de votre Centre régional de Pharmacovigilance (CRPV) ou sur www.signalement-sante.gouv.fr.

© 2021 BioMarin International Ltd. Tous droits réservés.
EU/PAL/0340 V01 Janvier 2021

B:OMARIN®

Pegvaliase (PALYNZIQ®▼)

CARTE PATIENT

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire. Cela permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier.ère. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement sur www.signalement-sante.gouv.fr.

Nom du patient: _____

Âge: _____

Informations relatives aux allergies: _____

Autres problèmes de santé (tels que l'asthme): _____

IMPORTANT : Portez toujours un dispositif d'injection d'adrénaline et cette carte sur vous. Montrez cette carte au personnel médical en cas d'urgence.

Coordonnées du contact d'urgence:

Nom du contact d'urgence: _____

Informations sur le contact d'urgence: _____

Nom du médecin: _____

Coordonnées de contact du médecin: _____

Coordonnées de contact du médecin en dehors des heures de travail: _____

Ce patient est traité par le pegvaliasé. Ce médicament peut provoquer des réactions allergiques graves qui peuvent mettre sa vie en danger et ces réactions peuvent survenir à tout moment après une injection de pegvaliasé.

Les symptômes d'une réaction allergique grave peuvent inclure:

- Un gonflement du visage, des yeux, des lèvres, de la bouche, de la gorge, de la langue, des mains et/ou des pieds
- Une difficulté à respirer ou une respiration sifflante
- Une sensation de gorge serrée ou d'étouffement
- Une difficulté à avaler ou à parler
- Une sensation d'étourdissement ou d'évanouissement
- Une perte de contrôle des urines ou des selles
- Des battements cardiaques rapides
- Un urticaire (par exemple, rash cutané avec démangeaisons et un aspect de peau d'orange) qui se propage rapidement
- Des bouffées de chaleur
- Des crampes ou des douleurs intenses de l'estomac, des vomissements ou une diarrhée