

**IMPORTANT
CARTE DE MISE EN GARDE**

LAMOTRIGINE
5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg,
comprimé dispersible ou à croquer
Conserver cette carte
sur vous en permanence

Les patients traités par Lamotrigine peuvent présenter une réaction allergique ou une réaction cutanée, ces réactions peuvent être graves et mettre en jeu la vie du patient si elles ne sont pas traitées.

**CONSULTEZ IMMEDIATEMENT
VOTRE MEDECIN, si :**

1. vous présentez une éruption cutanée ou rougeur OU,
2. vous présentez un des symptômes suivants :
 - fièvre, symptômes pseudo-grippaux,
 - gonflement du visage,
 - apparition de ganglions,
 - irritation de la bouche ou des yeux,
 - bleus ou saignements inattendus,
 - gorge douloureuse.

**VOTRE MEDECIN POURRA DECIDER
D'ARRETER LE TRAITEMENT** (voir au verso)

Contactez immédiatement votre médecin si vous suspectez une réaction cutanée ou une réaction allergique à **LAMOTRIGINE**

Veuillez indiquer ci-dessous les coordonnées de votre médecin :

Docteur

Tél.

En cas d'absence de celui-ci, contactez immédiatement un autre médecin pour avis médical (par exemple : service des urgences de l'hôpital le plus proche) et montrez lui cette carte.

Exemple de carte présente dans les boîtes de spécialités à base de lamotrigine (Lamictal ou un médicament générique).