




New code: 00000000	00000000	Size: 150 x 100 mm	00000000	PAGE 1 of 2	Technical approval
Date: 08.08.18	Version 1	B/code:	Information: Bonviva		Date:.....
Update:					Signed:.....
Notes: Special instructions:			Colour PMS	Colour CMYK	OK for printing PDF*
Laetus:					
Type size: 8pt.			Date:.....		
Previous ref: 00000000			Signed:.....		
 Miles Gray Road, Basildon, Essex. SS14 3FR United Kingdom © 2018					

Date de début de traitement et coordonnées :

Date de la première injection/perfusion :
.....

Nom de votre médecin :

Coordonnées de votre médecin :

Nom de votre Dentiste :

Coordonnées de votre Dentiste :

Assurez-vous d'avoir la liste de tous vos médicaments lorsque vous voyez un professionnel de santé.

Interrogez votre médecin, infirmier/ère ou votre dentiste si vous avez des questions à propos des informations de cette carte.

DATE D'APPROBATION ANSM : Février 2017 VERSION 1.0. - Réf. DMR-BOND-17/0002 - Etabli le 02/03/2017



Carte patient BONDRONAT®

Cette carte contient d'importantes informations de sécurité dont vous devez avoir connaissance avant et pendant le traitement par injection d'acide ibandronique (Bondronat®) pour un cancer.

Votre médecin vous a prescrit de l'acide ibandronique, qui est utilisé chez les adultes pour un cancer du sein qui s'est propagé dans les os, ou pour un taux élevé de calcium dans le sang dû à une tumeur. L'acide ibandronique aide à prévenir la fracture des os et à stopper leur fragilisation en réduisant la quantité de calcium qui est perdue dans les os.

Un effet indésirable appelé ostéonécrose de la mâchoire (ONM) (lésions osseuses graves de la mâchoire) a été très rarement rapporté chez les patients recevant de l'acide ibandronique pour un cancer. L'ONM peut aussi survenir après l'arrêt du traitement.

Il est important d'essayer de prévenir le développement de l'ONM car c'est une affection douloureuse qui peut être difficile à traiter. Certaines précautions doivent être prises dans le but de réduire le risque de développer une ostéonécrose de la mâchoire.

Avant de commencer le traitement :

Informez votre médecin, infirmier/ère ou pharmacien (professionnel de santé) si vous présentez des problèmes au niveau de la bouche ou de vos dents ou si vous portez des prothèses dentaires.

Votre médecin peut vous demander de faire un examen dentaire si vous :

- Avez déjà été traité avec un médicament appelé bisphosphonate,
- Prenez des médicaments appelés corticostéroïdes (tels que la prednisolone ou la dexaméthasone),
- Etes fumeur,
- N'avez pas eu de bilan dentaire depuis longtemps,
- Présentez des problèmes au niveau de votre bouche ou de vos dents.

Pendant votre traitement :

- Vous devez maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire, vous brosser les dents régulièrement et avoir des examens dentaires réguliers. Si vous portez des prothèses dentaires, vous devez vous assurer qu'elles s'adaptent correctement.
- Si vous êtes sous traitement dentaire ou si vous allez subir une chirurgie dentaire (telle que des extractions dentaires), informez votre médecin et dites à votre dentiste que vous êtes traité par l'acide ibandronique (Bondronat®).
- Contactez immédiatement votre médecin et votre dentiste si vous rencontrez des problèmes au niveau de votre bouche ou de vos dents comme un déchaussement des dents, une douleur ou gonflement, une non-cicatrisation des plaies ou un écoulement, car ces symptômes pourraient être des signes d'une ostéonécrose de la mâchoire.

Veuillez lire la notice qui accompagne votre médicament pour plus d'informations.