





New code:	<b>00000000</b>	00000000
Date:	08.08.18	Version 1
Update:		B/code:
Notes:	Special instructions:	
Laetus:		
Type size:	8pt.	
Previous ref.:	<b>00000000</b>	
 <b>ATNAHS</b>	Miles Gray Road, Basildon, Essex. SS14 3FR United Kingdom © 2018	

Size:	150 x 100 mm	00000000	PAGE 1 of 2
Information:	Bonviva		
Colour PMS	Colour CMYK		
			

Technical approval
Date:.....
Signed:.....
'OK for printing PDF'
Date:.....
Signed:.....

## Date de début de traitement et coordonnées :

Date de la première injection/perfusion :  
 .....  
 Nom de votre médecin : .....  
 Coordonnées de votre médecin : .....  
 .....  
 Nom de votre Dentiste : .....  
 Coordonnées de votre Dentiste : .....  
 .....

**Assurez-vous d'avoir la liste de tous vos médicaments lorsque vous voyez un professionnel de santé.**

**Interrogez votre médecin, infirmier/ère ou votre dentiste si vous avez des questions à propos des informations de cette carte.**

DATE APPROBATION ANSM - Février 2017 VERSION 1.0 - Réf.DME-BONV-17/0001 - Etabli le 02/03/2017



## Carte patient BONVIVA®

*Cette carte contient d'importantes informations de sécurité dont vous devez avoir connaissance avant et pendant le traitement par l'acide ibandronique (Bonviva®).*

Votre médecin vous a prescrit de l'acide ibandronique, qui est utilisé pour traiter l'ostéoporose post-ménopausique. Cette maladie induit un amincissement et une fragilisation des os qui peuvent se fracturer plus facilement.

Un effet indésirable appelé ostéonécrose de la mâchoire (ONM) (lésions osseuses graves de la mâchoire) a été très rarement rapporté chez les patients recevant de l'acide ibandronique pour l'ostéoporose. L'ONM peut aussi survenir après l'arrêt du traitement.

Il est important d'essayer de prévenir le développement de l'ONM car c'est une affection douloureuse qui peut être difficile à traiter. Certaines précautions doivent être prises dans le but de réduire le risque de développer une ostéonécrose de la mâchoire.

## Avant de commencer le traitement :

Informez votre médecin, infirmier/ère ou pharmacien (professionnel de santé) si vous présentez des problèmes au niveau de la bouche ou de vos dents ou si vous portez des prothèses dentaires.

Votre médecin peut vous demander de faire un examen dentaire si vous :

- Avez déjà été traité avec un médicament appelé bisphosphonate,
- Prenez des médicaments appelés corticostéroïdes (tels que la prednisolone ou la dexaméthasone),
- Etes fumeur,
- Avez un cancer,
- N'avez pas eu de bilan dentaire depuis longtemps,
- Présentez des problèmes au niveau de votre bouche ou de vos dents.

## Pendant votre traitement :

- Vous devez maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire, vous brosser les dents régulièrement et avoir des examens dentaires réguliers. Si vous portez des prothèses dentaires, vous devez vous assurer qu'elles s'adaptent correctement.
- Si vous êtes sous traitement dentaire ou si vous allez subir une chirurgie dentaire (telle que des extractions dentaires), informez votre médecin et dites à votre dentiste que vous êtes traité par l'acide ibandronique (Bonviva®).
- Contactez immédiatement votre médecin et votre dentiste si vous rencontrez des problèmes au niveau de votre bouche ou de vos dents comme un déchaussement des dents, une douleur ou un gonflement, une non-cicatrisation des plaies ou un écoulement, car ces symptômes pourraient être des signes d'une ostéonécrose de la mâchoire.

Veillez lire la notice qui accompagne votre médicament pour plus d'informations.